9	種	地	0.002680	−1.0070
8	種	地	0.003340	−1.6010
7	種	地 a	0.002020	−0.4790
		地 b	0.001780	−0.4290
6	種	地 a	0.001120	0.1960
		地 b	0.000920	0.2160
5	種	地	0.000030	0.7945
4	種	地	0.000150	0.7285
3	種	地	0.000450	0.5935
2	種	地	0.000060	0.7300
1	種	地	0.000080	0.7260
Ⅱの地域				
10	種	地	0.000360	0.5830
9	種	地	0.000820	0.1460
8	種	地	0.000760	0.2000
7	種	地	0.000780	0.1830
6	種	地	0.000080	0.7430
5	種	地	0.000140	0.6980
4	種	地	0.000270	0.6070
3	種	地	0.000120	0.6970
2	種	地	0.000100	0.7070
1	種	地	0.000080	0.7140

普通態容補正（給与差等）			
1	級	地	0.235
2	級	地	0.229
3	級	地	0.228
4	級	地	0.223
5	級	地	0.221
6	級	地	0.214
7	級	地	0.209
無	級	地	0.204

寒冷補正			給与差	寒冷度
4	級	地	0.002	0.240
3	級	地	0.003	0.120
2	級	地	0.003	0.043
1	級	地	0.003	0.021
無	級	地	0.000	0.000

9	種	地	0.002700	−1.0200
8	種	地	0.003340	−1.5960
7	種	地 a	0.001920	−0.3890
		地 b	0.001790	−0.4315
6	種	地 a	0.001210	0.1435
		地 b	0.000910	0.2285
5	種	地	0.000030	0.8005
4	種	地	0.000160	0.7290
3	種	地	0.000450	0.5985
2	種	地	0.000060	0.7350
1	種	地	0.000070	0.7330
Ⅱの地域				
10	種	地	0.000380	0.5690
9	種	地	0.000800	0.1700
8	種	地	0.000780	0.1880
7	種	地	0.000780	0.1880
6	種	地	0.000060	0.7640
5	種	地	0.000160	0.6890
4	種	地	0.000260	0.6190
3	種	地	0.000120	0.7030
2	種	地	0.000107	0.7096
1	種	地	0.000080	0.7190

普通態容補正（給与差等）			
1	級	地	0.229
2	級	地	0.223
3	級	地	0.222
4	級	地	0.218
5	級	地	0.215
6	級	地	0.208
7	級	地	0.204
無	級	地	0.199

寒冷補正			給与差	寒冷度
4	級	地	0.002	0.240
3	級	地	0.003	0.120
2	級	地	0.003	0.043
1	級	地	0.003	0.021
無	級	地	0.000	0.000