	の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、総苞の大きさ、花盤の直径、花盤の色、開花の早晩	
（略）	（略）	（略）
（略）	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌そうの周縁部の形状、菌そうの厚さ、菌そうの表面の形状、菌そう表面の着色の有無、菌そう裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、子実体株の径、菌さんの直径、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの縦断面の形、菌さんの表面の主な色、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の硬さ、子実体株の平均重量、培養菌床の表面被（皮）膜の色、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間	（略）
（略）	（略）	（略）
（略）	草姿、草丈、茎の長さ、茎の太さ、茎の主な色、最大葉の着生位置、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色、葉身の裏面の主な色、葉身の横断面の形、葉身の縦断面の反り、葉身の先端部の形、葉縁の鋸歯の深さ、葉柄の長さ、花序の型、花序の長さ、花序の幅、がくのアントシアニンの着色、花の直径、花弁の主な色、やくの色、花粉の色、子房の主な色	（略）
（略）	（略）	（略）

	舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、総苞の大きさ、花盤の直径、花盤の色、開花の早晩	
（略）	（略）	（略）
まいたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の厚さ、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の表面の形状、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（15℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（30℃／日）、子実体株の径、菌さんの大きさ、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの断面の形、菌さんの表面の色、菌さんの肉質、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の形、培養菌床の表面被（皮）膜の形成、培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間）、子実体の生育最適温度、子実体の平均乾燥重量	（略）
（略）	（略）	（略）
ムラサキベンケイソウ	草姿、植物体の高さ、茎の長さ、茎の太さ、茎の主な色、最大葉の着生位置、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色、葉身の裏面の主な色、葉身の横断面の形、葉身の縦断面の形、葉身の先端の形、葉縁の鋸歯の深さ、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、がくのアントシアニン着色の強弱、花の直径、花弁の主な色、やくの色、花粉の色、子房の主な色	（略）
（略）	（略）	（略）