39　ビタミン$B_1$　270点
40　赤血球プロトポルフィリン、ビタミン$B_2$　280点
41　プロカルシトニン（ＰＣＴ）　320点
42　ビタミンＣ　330点
43　１，25ジヒドロキシビタミン$D_3$（１，25（OH）$_2D_3$）　400点
注　患者から１回に採取した血液を用いて本区分の１から９までに掲げる検査を５項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ　５項目以上７項目以下　95点
ロ　８項目又は９項目　104点
ハ　10項目以上　123点
注　入院中の患者について算定した場合は、初回に限り20点を加算する。
（生化学的検査(Ⅲ)）

Ｄ００８　内分泌学的検査
1　ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定性　55点
2　11―ハイドロキシコルチコステロイド（11―ＯＨＣＳ）、17―ハイドロキシコルチコステロイド（17―ＯＨＣＳ）　60点
3　17―ケトステロイド（17―ＫＳ）、ホモバニール酸（ＨＶＡ）　70点
4　バニールマンデル酸（ＶＭＡ）　90点
5　５―ハイドロキシインドール酢酸（５―ＨＩＡＡ）　95点
6　プロラクチン（ＰＲＬ）　100点
7　レニン活性　110点
8　トリヨードサイロニン（$T_3$）、甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）、ガストリン、レニン定量　115点
9　サイロキシン（$T_4$）、インスリン（ＩＲＩ）　120点
10　成長ホルモン（ＧＨ）、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）、Ｃ―ペプタイド（ＣＰＲ）、黄体形成ホルモン（ＬＨ）　125点
11　ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）、サイロキシン結合能（ＴＢＣ）、遊離サイロキシン（$FT_4$）、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ（ＧＡＤ）抗体価、遊離トリヨードサイロニン（$FT_3$）、コルチゾール、アルドステロン、サイロキシン結合蛋白（ＴＢＧ）、テストステロン、サイログロブリン、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント（ＮＴ―proBNP）　140点
12　ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰＬ）、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ（ＨＣＧβ）分画、グルカゴン、カルシトニン　150点
13　Ⅰ型コラーゲン架橋Ｎ―テロペプチド（NTx）、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰ―５ｂ）　160点
14　オステオカルシン、骨型アルカリホスファターゼ（ＢＡＰ）、尿中βクロスラプス、セクレチン、プロジェステロン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(ＨＣＧ)、遊離テストステロン、βクロスラプス（尿を除く。）、低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）　170点
15　サイクリックＡＭＰ（Ｃ―ＡＭＰ）、エストリオール（$E_3$）、エストロジェン、副甲状腺ホルモン関連蛋白Ｃ端フラグメント（Ｃ―PTHrP）　180点
16　副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）、カテコールアミン分画、ＤＨＥＡ―Ｓ　190点
17　尿中デオキシピリジノリン、副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)、17―ケトジェニックステロイド（17―ＫＧＳ）、エストラジオール（$E_2$）　200点
18　副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）、17―ケトジェニックステロイド分画（17―ＫＧＳ分画）、カテコールアミン、17―ケトステロイド分画（17―ＫＳ分画）、エリスロポエチン、17α―ヒドロキシプロジェステロン、抗ＩＡ―２抗体、プレグナンジオール　220点
19　メタネフリン、ソマトメジンＣ、ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（ＨＡＮＰ）、メタネフリン・ノルメタネフリン分画、アルギニンバゾプレッシン　240点
20　プレグナントリオール、ノルメタネフリン　250点
21　インスリン様成長因子結合蛋白３型（ＩＧＦＢＰ―３）　280点
注　患者から１回に採取した血液を用いて本区分の10から21までに掲げる検査を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ　３項目以上５項目以下　410点
ロ　６項目又は７項目　630点
ハ　８項目以上　900点

Ｄ００９　腫瘍マーカー
1　尿中ＢＴＡ　80点
2　癌胎児性抗原（ＣＥＡ）、α―フェトプロテイン（ＡＦＰ）、組織ポリペプタイド抗原（ＴＰＡ）、扁平上皮癌関連抗原（ＳＣＣ抗原）　115点
3　ＤＵＰＡＮ―２、ＮＣＣ―ＳＴ―439、ＣＡ15―３、前立腺酸ホスファターゼ抗原　130点
4　エラスターゼ１　135点
5　ＰＳＡ、ＣＡ19―９　140点
6　塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ）、ＣＡ72―４、ＣＡ―50、SPan―１抗原、シアリルTn抗原、神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ）、ＰＩＶＫＡⅡ　150点
7　尿中ＮＭＰ22、シアリル$Le^X$―ｉ（ＳＬＸ）抗原、ＣＡ125、尿中サイトケラチン８・サイトケラチン18総量　160点
8　シアリル$Le^X$（ＣＳＬＥＸ）抗原、フリーＰＳＡ／トータルＰＳＡ比、ＢＣＡ225、Ⅰ型プロコラーゲン―Ｃ―プロペプチド、Ⅰ型コラーゲンＣテロペプチド、ＳＰ１、血清中抗ｐ53抗体　170点
9　サイトケラチン19フラグメント、ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）　180点
10　尿中遊離型フコース、ＣＡ602、ＡＦＰのレクチン反応性による分画比(ＡＦＰ―$L_3$%)、ＣＡ54／61、癌関連ガラクトース転移酵素（ＧＡＴ）　190点
11　γ―セミノプロテイン、ＣＡ130、尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア(ＨＣＧβ―ＣＦ)　200点
12　膵癌胎児性抗原（ＰＯＡ）　220点
13　乳頭分泌液中ＣＥＡ、乳頭分泌液中ＨＥＲ２タンパク、血清中ＨＥＲ２タンパク　320点
14　インターロイキン２受容体（ＩＬ―２Ｒ）　460点
注１　診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、１回に限り算定する。ただし、区分番号Ｂ００１の３に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。