表ダリアの項を次のように改める。

ダリア	草姿、草丈、茎の色、葉の型、葉軸の翼の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の色、葉の光沢の強弱、葉の表面のしわの強弱、葉脈の隆起の高低、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の基部の形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）、花柄の長さ、花柄の色、葉群に対する頭花の位置、頭花の向き、頭花の型、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）、頭花の副弁の有無、副弁の頭花に対する長さ、頭花の直径、頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の表面の形状、舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）、舌状花の中間部の横断面の形、舌状花の基部から四分の三地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）、舌状花の周縁部の巻き方、舌状花の周縁が巻く部分の位置、舌状花の縦断面の形、舌状花の縦方向の湾曲する位置、舌状花の湾曲の強弱、舌状花のねじれの強弱、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の二次色の分布位置、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布位置、舌状花の表面の三次色の型、舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色、舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）、頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）、花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）、花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）、管状花の色（アネモネ型品種に限る。）、副弁の色（コラレット型品種に限る。）、頭花の花色の変化

表デイアスキアの項中「株幅」を「株の幅」に、「下唇弁の側弁の反り」を「下唇弁の側弁の反りの強弱」に、「下唇弁の線状突起分泌腺の有無、線状突起分泌腺の密度、上唇弁の中央部の目の色」を「下唇弁の腺状突起の有無、腺状突起の密度、花冠の中央部の目の色」に改め、同表オーチャードグラスの項の次に次のように加える。

デロスペルマ	樹型、樹高、株の幅、枝の長さ、枝の太さ、節間長、葉の形、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の色、葉の表面の突起の有無、葉の表面の突起の形、花の形、花の大きさ、花柄の長さ、花の中心部の色、花弁の幅、花弁の表面の主な色、花弁の表面の複色の有無、花弁の表面の二次色、花弁の数、花の香りの有無、開花習性

表まさきの項及び同表ユーホルビア　ヒペリシフォリア（おとぎりばにしきそう）の項を次のように改める。

まさき	樹姿、樹高（無摘心）、樹高（摘心）、新しょうの太さ、枝の帯化性の有無、新しょうの色、節間長、葉身の全体の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉の周縁の形状、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、幼葉の表面の色、幼葉の斑の有無、幼葉の斑の模様、幼葉の斑の色、幼葉の斑の色の割合、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、葉の斑の模様の色の割合、葉の斑の模様の色の移行性、葉の斑の模様の色の移行後の色、ほう芽期
ユーホルビア　ヒペリシフォリア（おとぎりばにしきそう）	草型、草丈、分枝の数、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉柄の長さ、葉柄の色、花房の幅、小花房の幅、花序の幅、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉の形、ほう葉の色

表ポインセチアの項を次のように改める。

ポインセチア	分枝の有無、分枝の数、樹高、樹の幅、茎の中間部の緑色の濃淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱、茎の上部のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の基部の形、葉身の表面の色数、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）、葉身の主な色（複色葉品種に限る。）、葉身の二次色（複色葉品種に限る。）、葉身の三次色（複色葉品種に限る。）、葉身の表面の主脈の色、葉身の切れ込みの数、葉身の切れ込みの深さ、葉身の主脈の曲がりの強弱、葉柄の長さ、葉柄の表面の緑色の濃淡、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱、部分着色葉の数、完全着色葉の数、着色葉の切れ込みの強弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱、ほうの数、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）、最大ほうの幅、最大ほうの形、ほうの表面の色数、ほうの表面の色（単色品種に限る。）、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）、ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの表面の斑点の強弱、ほうの表面の斑点の色、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）、ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）、ほうの主脈の巻き込みの有無、ほうのねじれの有無、ほうの葉脈間の縮れの強弱、集散花序の幅、蜜腺の大きさ、蜜腺の色、蜜線の変形の有無、開花の早晩

表トルコぎきょうの項を次のように改める。

トルコぎきょう	草丈、茎の節数、分枝の位置、葉の着き方、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉のろう粉の多少、葉の表面の緑色の濃淡、花らいの数、花型、花弁の数（八重品種に限る。）、花の直径、花の形、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の先端の形、花弁の周縁の波打ちの強弱、花弁の周縁のフリンジ、花弁の色数、花弁の表面の色（単色品種に限る。）、花弁の表面の主な色（複色品種に限る。）、花弁の表面の二次色（複色品種に限る。）、花弁の表面の二次色の面積の大きさ（複色品種に限る。）、花弁の表面の模様（複色品種に限る。）、花弁の裏面の色、花弁の表面の基部の色、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柄の長さ、雌ずいの形、開花始期

表いちごの項を次のように改める。

いちご	草姿、葉の粗密、草勢、分げつの多少、開花位置、ランナーの数、ランナーのアントシアニン着色の強弱、ランナーの毛の粗密、葉の大きさ、葉の表面の色、葉の表面の凹凸の強弱、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の斑の有無、頂小葉の大きさ、頂小葉の縦横比、頂小葉の基部の形、頂小葉の鋸歯の形、頂小葉の横断面の形、葉柄の長さ、葉柄の毛じの向き、たく葉のアントシアニン着色の強弱、花の数、果柄の長さ、小果柄の毛じの向き、花の直径、花弁の重なり、花冠に対するがく片の大きさ、雄しべの有無、花弁の縦横比、花弁の表面の色、花弁の表面の主な色（観賞用品種に限る。）、花弁の表面基部の色の濃淡（観賞用品種に限る。）、花糸のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）、花柱のアントシアニン着色の強弱（観賞用品種に限る。）、果実の大きさ、果実の縦横比、果実の形、第一番果と第二番果の果形の差、果皮の色、果皮の着色のむらの強弱、果実の光沢の強弱、果実の表面の凹凸の強弱、果実の無種子帯、果実のネックの有無、そう果の落ち込み、そう果の密度、そう果のアントシアニン着色の強弱、果実のがくの着生位置、果実のがく片の付き方、果径に対するがくの大きさ、果実からのへた離れの難易、果実の硬さ、果肉の色、果心の色、果実の空洞、開花始期、果実の成熟期、季性、可溶性固形物含量、酸度、果実の香りの強弱、休眠性、炭そ病抵抗性、萎黄病抵抗性