表グロキシニア　シルバティカの項を次のように改める。

グロキシニア　シルバティカ	草丈、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、一茎当たりの花の数、花柄の長さ、花冠の長さ、花冠筒の直径、花冠先端の直径、花冠裂片の色、花冠外面の色、花冠内面の色、花冠内面の模様（斑点）の明瞭度、開花始期

表グロキシニア　シルバティカの項の次に次のように加える。

グレコマ　ヘデラケア	株の幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、花の長さ、花の幅、花の色、花冠における着色部の色、下唇弁における斑紋の有無、下唇弁における斑紋の色

表グラプトペタルムの項、同表まったけの項及び同表グズマニアの項を次のように改める。

グラプトペタルム	草型、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の縦断面の形、葉の横断面上面の形、葉の横断面下面の形、葉の先端の形、葉の緑色部の有無、葉の緑色部の色、葉の白粉の強弱、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の部位、葉のアントシアニン着色の強弱、葉の模様の有無、葉の先端の芒（剛毛）の有無、葉の先端の芒（剛毛）の色、花序の型、つぼみの形、がくの長さ、花の直径、花の形、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花の地色、花の模様の有無、花の模様、花の模様の色
まいたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の厚さ、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の表面の形状、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（15℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（30℃／日）、子実体株の径、菌さんの大きさ、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの断面の形、菌さんの表面の色、菌さんの肉質、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の形、培養菌床の表面被(皮)膜の形成、培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間）、子実体の生育最適温度、収量性、対峙培養（帯線形成）
グズマニア	草丈、株の幅、葉の数、葉しょうの長さ、葉しょうの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の有無、葉身の表面の二次色の模様、葉身の表面の二次色の主な色、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布、花序の型、花序の位置、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の着花部の直径、花序のほうの数、花序の一ほう内の小花の数、花序の一ほう内の小花の総数（一ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）、ほうの長さ、ほうの幅、ほうの先端の幅、ほうの先端の形、ほうの表面の色、ほうの裏面の色、前出葉の長さ、前出葉の幅、前出葉の色、がくの色、花冠の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色

表はすのはぎりの項を次のように改める。

はすのはぎり	樹姿、樹高、枝の色、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色数、葉身の地色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の最も濃い色、葉身の斑の二番目に濃い色、葉身の斑の三番目に濃い色、葉身のアントシアニン着色の有無

表びまわりの項中「葉の色」を「葉の緑色の濃淡」に改め、「開花期」の次に「、花型」を加え、同表ヒロケレウス　ウンダツス（ドラゴンフルーツ）の項を次のように改める。

ヒロケレウス　ウンダツス（ドラゴンフルーツ）	葉状茎の長さ、葉状茎の幅、葉状茎の横断面の形、葉状茎の色、葉状茎の周縁の起伏、とげの長さ、とげの主な色、とげ座の間隔、とげの多少、つぼみのりん片先端の着色の有無、一葉状茎当たりの着花数、花の長径、花被の色、自家結実性、果実の重さ、果実の縦断面の形、果実のりん片の大きさ、果実のりん片の数、果実のりん片の先端の形、果実のりん片の先端の向き、果皮の厚さ、果実の表面の色の均一性、果実の表面の主な色、果実の表面のとげの有無、果肉の色の均一性、果肉の色、果実の糖度、成熟種子の数、種子の大きさ、開花始期、開花の回数、収穫始期

表そよごの項を次のように改める。

そよご	樹姿、樹高、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の基部の形、当年葉の反りの強弱、前年葉の反りの強弱、当年葉の波打ちの強弱、前年葉の波打ちの強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、当年葉の表面の緑色の濃淡、前年葉の表面の緑色の濃淡、新葉のアントシアニン着色の有無、葉の斑の有無、花の直径、花弁の形、花柄の長さ、房成りの有無、果実の形、果実の大きさ、果実の色

表イレシネ　リンデニーの項を次のように改める。

イレシネ　リンデニー	草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の有無、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の斑の位置、葉身の斑の色数、葉身の斑の主な色、葉身の光沢の強弱、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉柄の長さ、葉柄の色

表レタスの項中「レタスモザイクウイルス抵抗性」の次に「、レタスビッグベイン病抵抗性」を加え、同表くろみのうぐいすかずら（くスカンプ）の項中「くろみのうぐいすかずら」を「くろみのうぐいすかぐら」に改め、同表ほんしめじの項を次のように改める。

ほんしめじ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の表面の色、菌叢の裏面中央部の色、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（10℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（15℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（20℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（25℃／日）、菌糸体の温度別生長速度（30℃／日）、菌さんの断面の形、菌さんの表面のいぼの有無、菌さんの大きさ、菌さんの中央部の色、菌さんの周縁部の色、菌さんの表面の模様の有無、菌さんの厚さ、菌さんの直径／菌柄の長さ、子実層たくの色、子実層たくの並び方、子実層たくの密度、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、菌柄の最大直径／菌さん下の菌柄の直径、子実体の発生型、最適培養期間（種菌接種後覆土までの培養期間）、覆土の必要性の有無、発生最盛期までの期間（発生処理後から収穫適期までの期間）、原基形成最適温度、子実体の生育最適温度、収量、有効茎数、対峙培養（帯線形成）

表りんごの項を次のように改める。

りんご	樹勢、樹の型（生食用品種に限る。）、枝の数（台木用品種に限る。）、樹姿（生食用の分枝型品種に限る。）、結実の型（生食用品種に限る。）、新しょうの姿勢（台木用品種に限る。）、新しょうの伸長状態（台木用品種に限る。）、枝の毛じの多少（台木用品種に限る。）、枝の表面の光沢の強弱（台木用品種に限る。）、えき花芽の着生（台木用品種に限る。）、枝の太さ、節間長、枝の色（生食用品種に限る。）、枝の毛じの粗密、皮目の