	花弁に対する配置（一重品種に限る。）、花弁の数（八重品種に限る。）、横から見た花の断面の形、花弁の不規則な条や斑点の有無、花の主な色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）、花弁の条や斑点の色（不規則な条や斑点のある品種に限る。）、がくの反転の強弱、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱、上部花弁の幅、上部花弁の形、上部花弁の先端の形、上部花弁の表面の周縁部の色、上部花弁の表面の中央部の色、上部花弁の裏面の色、上部花弁の模様の明瞭度、上部花弁の模様の形、上部花弁の最大の斑点の大きさ、上部花弁の斑点の色、上部花弁の基部の複色部の有無、上部花弁の基部の複色部の大きさ、上部花弁の基部の複色部の色、下部花弁の表面の周縁部の色、下部花弁の表面の中央部の色、下部花弁の裏面の色、下部花弁の模様の明瞭度、下部花弁の模様の形、下部花弁の最大の斑点の大きさ、下部花弁の基部の複色部の有無、下部花弁の基部の複色部の大きさ、下部花弁の基部の複色部の色、内部花弁の表面の中央部の色（八重品種に限る。）、開花始期

表くさそんだんかの項を次のように改める。

ペンタス	草姿、草丈、茎の節間長、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の毛の粗密、葉身の波打ちの強弱、花序の花の数、花序の長径、花序の短径、花序の高さ、花序の上部の形、花型、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の色、花喉部の内面の毛の色、花冠裂片の向き、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色（単色品種を除く。）、花冠裂片の表面の二次色の分布（単色品種を除く。）、やくの花喉部上部に対する位置、花粉の色、花柱の長さ、柱頭の大きさ、柱頭の色

表ミューサイランの項を次のように改める。

フォルミウム	草姿、草丈、分枝の数、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の反り、葉身の横断面の形、葉身のねじれの有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の模様の形、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色の模様の形、葉身の表面の三次色、葉身の表面の色の安定度、葉身の裏面の色数、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の三次色、葉身の表面の光沢の有無

表ロードデンドロンの項を次のように改める。

ロードデンドロン	葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形(一花序当たりの着花数が六以上の品種に限る。)、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数（八重品種に限る。）、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の形（常緑の品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の横断面の形(常緑品種に限る。)、成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）

表さとうきびの項を次のように改める。

さとうきび	草型、葉しょうの包合度、発芽性、ほう芽性、初期伸長性、分げつ性、遅発茎数、葉群の疎密、葉群の緑色の濃淡、仮茎長、節間長、節間部の長径、節間部の形、節間部の横断面の形、節間部のずい孔率、節間部の複合色、節間部の基本色、節間部の生長亀裂の深さ、節間部の稲妻屈曲の強弱、節間部の茎皮硬度、節間部の茎皮表面の粗滑、節間部のろう質物の多少、根帯の幅、根帯の色、ろう帯の幅、芽子の形(芽翼を除く。)、芽子の大きさ（芽翼を除く。）、芽子の突出度（第二老化葉着生節）、芽溝の深さ、芽溝の長さ、芽子先端部の生長帯に対する位置、芽子の毛の有無、芽子の毛の位置、芽子基部と葉しょう痕の間の広さ、芽翼の幅、葉しょうの長さ、葉しょうの毛群の多少、葉しょうの毛群の長さ、葉しょうの毛群の分布、葉舌の形、葉舌の幅、葉舌の毛群の長さ、葉舌の毛群の粗密、葉しょうの包合部下面の葉耳の形、葉しょうの包合部下面の葉耳の大きさ、葉しょうの包合部上面の葉耳の形、葉しょうの包合部上面の葉耳の大きさ、肥厚帯の色、葉身の反り、葉身の幅、中肋の幅、葉身の幅に対する中肋の幅の比、葉身の長さ、葉身の周縁の毛の疎密、葉身の周縁の鋸歯の有無、しょう頭部の長さ、しょう頭部の横断面の形、しょう頭部の色、しょう頭部のろう質物の多少、原料茎の長さ、茎径、一茎重、原料茎の多少、脱葉性、出穂性、登熟の早晩性、糖分含量、耐干性、黒穂病抵抗性

表シュルンベルゲラ（旧ジゴカクタス）の項を次のように改める。

シュルンベルゲラ（旧ジゴカクタス）	草姿、三次葉状茎の数、葉状茎の長さ、葉状茎の最大幅、葉状茎の色、葉状茎の周縁部の鋸歯の形、葉状茎の鋸歯の深さ、葉状茎の横断面の湾曲の強弱、葉状茎の周縁部の波打ちの強弱、1㎝長のつぼみの先端の色、1㎝長のつぼみの色の濃淡、1.5㎝長のつぼみの先端の形、花の形、花の直径、花の長さ、花被片の花筒開口部に対する姿勢、花被片の幅、花被片の基部の淡色部の大きさ、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）、花被片の中間部の色の違いの有無、花被片の中間部の色、花被片の色の境界の明瞭度（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色が占める割合（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色、花筒の開口部の形、花筒の開口部の輪状着色の有無、花筒の開口部の輪状着色部の幅、花筒の外面の色、雄ずいの長さ、花糸の色、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、子房の色、開花始期、開花期間

表なす（ぼれらしょを除く。）の項中「茎の毛じの粗密」の次に「、茎のとげの有無」を、「葉身の凹凸の強弱」の次に「、葉身のとげの有無」を、「葉身の緑色の濃淡」の次に「(観賞用品種を除く。)、葉身の色の数（観賞用品種に限る。)、葉身の主な色（観賞用品種に限る。)、葉身の二次色（観賞用品種に限る。)、葉身の三次色（観賞用品種に限る。)」を、「完熟期」の次に「、単為結果性の有無」を加え、同表はなびらたけの項を次のように改める。

はなびらたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度（15℃／30日）、菌糸体の温度別生長速度(20℃／30日)、菌糸体の温度別生長速度（25℃／30日）、子実体の径、子実体の高さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、子実体の枝の多少、子実体の花弁状片の形、子実体の枝の色、子実体の枝の厚さ、子実体の枝の肉質、子実体の発生型、原基形成発生最適温度、子実体の生育最適温度、発生最盛期までの期間（種菌接種から収穫適期までの期間)、発生操作から収穫期までの期間、収量、対峙培養（帯線形成）