表やまのいもの項を次のように改める。

やまのいも	葉の着生密度、分枝の数、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、むかごの数、むかごの大きさ、むかごの外皮の褐色の濃淡、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の色、葉身の葉脚部のくぼみの深さ、葉身の周縁のくびれの強弱、葉柄の長さ、いもの長さ、いもの幅、いもの縦断面の形、いもの横断面の形、いもの外皮の色、いもの首部の長さ、いもの肉色、いもの肉の硬さ、いもの粘度の強弱、いもをすりおろした後の変色性（いもの肉色が白色又はクリーム色の品種に限る。）、雌雄性、成熟期

表アメリカデイコの項を次のように改める。

アメリカデイコ	開花枝の長さ、開花枝の太さ、開花枝の反りの強弱、開花枝の緑色の濃淡、開花枝の上面のアントシアニン着色の強弱、開花枝のとげの有無、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、先端小葉の葉身の長さ、先端小葉の葉身の幅、葉柄のとげの有無、開花枝の花らいの数、つぼみの長さ、つぼみの幅、つぼみの主な色、花の縦径、旗弁の長さ、旗弁の幅、旗弁の形、旗弁の横断面の形、旗弁の内面の複色の有無、旗弁の内面の主な色、旗弁の内面の複色の分布状態（旗弁に複色がある品種に限る。）、旗弁の内面の複色の色（旗弁に複色がある品種に限る。）、旗弁の外面の複色の有無、旗弁の外面の主な色（内面と明確に異なる場合に限る。）、舟弁の長さ、舟弁の幅、舟弁の外面の主な色、雄ずいの花糸の色

表フェリキアの項を次のように改める。

フェリキア	草姿、株の幅、株の高さ、茎の長さ、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の有無、着らい分枝の数、節間長、葉序、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の基部の形、葉のねじれの強弱、茎の中間部の葉の表面の主な色、茎の上部の葉と中間部の葉との表面の色の相違の有無、茎の上部の葉の表面の主な色（中間部の葉と色が異なる品種に限る。）、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、葉の光沢の有無、葉の毛の有無、葉の着生角度、花房の形、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄のアントシアニン着色の有無、花の形、花の大きさ、花房の花の数、舌状花の重なり、舌状花の数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、総ほうの大きさ、花盤の直径、花盤の色、開花の早晩

表フィトニアの項を次のように改める。

フィトニア	草丈、株張り、分枝の数、節間長、茎の太さ、茎の色、若葉の向き、若葉の表面の葉脈の色、若葉の表面の葉脈の粗密、若葉の表面の緑色部の色、若葉の表面の緑色部の割合、若葉の表面の複色の有無、若葉の表面の複色の色、若葉の裏面の緑色の濃淡、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の葉脈の色、成葉の表面の葉脈の粗密、成葉の表面の緑色部の色、成葉の表面の緑色部の割合、成葉の表面の複色の有無、成葉の表面の複色の色、成葉の表面の光沢の強弱、成葉の先端の形、成葉の基部の形、成葉の縁の波打ちの有無、成葉の縁の波打ちの粗密、葉柄の上面の色

表フリージアの項を次のように改める。

フリージア	草丈、分枝の数、葉の向き、花茎の長さ、花茎の太さ、茎の表面の粗さ、葉の幅、花序の長さ、花序の花の数、第一花と第二花の花間長、第二花と第三花の花間長、花軸の屈曲の強弱、花軸の曲がりの有無、花の並ぶ角度、花序の角度、つぼみの長さ／幅、花型、内花被の着生角度、外花被の形、内花被の形、内花被の横断面の形、内花被の周縁の巻き込みの有無、側方外花被の表面の主な色、中央外花被の表面の主な色、側方内花被の表面の色、中央内花被の表面の色、中央外花被の表面の斑紋の大きさ、中央外花被の表面の斑紋の色、喉部の大きさ、喉部外側の主な色、喉部内側の主な色、喉部内側の条線の強弱、花筒の長さ、花糸の主な色、やくの主な色、花柱の主な色、柱頭のやくに対する位置、柱頭の裂片の長さ、柱頭の裂片の粗密、柱頭の色、球茎の長さ／直径、開花期

表ガザニアの項を次のように改める。

ガザニア	草姿、草丈、株の幅、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）、茎の色（ロゼット型の品種を除く。）、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）、茎の分枝性（ロゼット型の品種を除く。）、節間長（ロゼット型の品種を除く。）、葉序（ロゼット型の品種を除く。）、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、深裂葉の割合、葉の表面の色、葉の表面の毛の有無、頭花の直径、舌状花の数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花表面基部の模様の有無、舌状花表面基部の模様の色、花盤の直径、花盤の色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の粗密

表グロブラリア　サルコフィラの項を次のように改める。

グロブラリア　アラビカ	樹形、樹高、分枝の位置、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の形、葉の先端部の形、葉の基部の形、葉の横断面の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の毛の有無、花序の型、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の粗密、頭花の色、頭花の形、頭花の直径、小花の長さ、小花の幅、小花の下唇弁の切れ込みの深さ、小花の対称性、小花の色、花の香りの有無

表グロキシニア　シルバティカの項中「グロキシニア　シルバティカ」を「グロキシニア」に改める。

同表大豆の項を次のように改める。

大豆	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、伸育型、分枝の数、草姿、茎の毛じの色、茎の長さ、茎の節数、葉の表面の凹凸の強弱、小葉の数、側小葉の形、側小葉の大きさ、葉の緑色の濃淡、花の色、最下着きょう節位の高さ、着きょう密度（枝豆用品種に限る。）、若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）、若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）、若さやの幅（枝豆用品種に限る。）、湯煮（ブランチング）後のさやの色（枝豆用品種に限る。）、多粒さや率（枝豆用品種に限る。）、さやの数、裂きょうの難易、熟さやの色の濃淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）、子実の形、種皮の単色複色の別、種皮の地色、種皮の二次色（複色品種に限る。）、種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無、子実のへその色、胎座部の色、子実の子葉の色、開花始期、成熟期、生態型、粗タンパク含有率、７Ｓタンパク質サブユニットの有無、リポキシゲナーゼアイソザイムの有無、へそ周辺の着色抵抗性、ダイズモザイクウイルス抵抗性、ダイズシストセンチュウ抵抗性

表けぶかわたの項を次のように改める。

けぶかわた	草姿、葉の粗密、草丈、結果枝の長さ、最下結果枝の着生位置、結果枝の節数、結果枝の節間長、茎の色、葉身の大きさ、葉の形、葉の裂片の有無、葉の裂片の深さ、葉の緑色の濃淡、葉の裏面の毛の粗密、葉身の蜜腺の有無、茎上部の毛の粗密、ほう葉の大きさ、ほう葉の鋸歯の細かさ、果柄の長さ、柱頭のやくに対する位置、花の着き方、花弁の色、花粉の色、花弁のスポットの強弱、さく果の開じょの強弱、さく果の大き