	さ、さく果の縦断面の形、さく果の表面のくぼみの細かさ、さく果の先端の突出の強弱、百粒重、種子の地毛の有無、種子の地毛の色、種子の地毛の粗密、繰綿の実綿に対する重さの割合、繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。）、繊維の長さ（繊維用品種に限る。）、繊維の色、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）、繊維の細かさ（繊維用品種に限る。）、さく果の開じょ期

表クレボルス（クリスマスローズ）の項を次のように改める。

ヘレボルス（クリスマスローズ）	草丈、株幅、花の位置、花数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身のアントシアニン着色の強弱、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の光沢の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、一花茎の花数、花の向き、花の形、花型、花の大きさ、がく片の数、がく片の形、がく片の周縁部の波打ちの強弱、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の先端の形、がく片の表面の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面の模様の有無、がく片の表面の模様の型、がく片の表面の模様の色、がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色、がく片の色の変化の有無、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の変化がある品種に限る。）、開花終期のがく片の裏面の色（がく片の色の変化がある品種に限る。）、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る。）、花糸の色、雌ずいの色、花首のしわの有無、開花期

表大麦の項中「止め葉が反曲した植物体の出現の多少」を「止め葉の葉しょう表面のろう質の多少」に改め、同表ホップの項を次のように改める。

ホップ	主茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の大きさ、葉身の表面の凹凸の強弱、葉身の表面の色、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）、開花期、草型、草姿、植物体の上部の大きさ、主茎中央部の側枝の長さ、主茎上部の側枝の長さ、主茎中央部の側枝の葉の密度、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数、主茎中央部の側枝の総きゅう果数、主茎上部の側枝の総きゅう果数、きゅう果の摘果期、きゅう果の大きさ、きゅう果の形、きゅう果のほうの開く程度、きゅう果の緑色の濃淡、ほうの大きさ、ほうの幅／長さ、外ほう先端の長さ、α酸含量、β酸／α酸、α酸中のフムロン含量、α酸中のコフムロン含量

表ヒヤシンスの項中「ヒヤシンス」を「ヒアシンス」に改め、同表アフリカほうせんかの項の次に次のように加える。

チガヤ	草姿、草丈、葉群の高さ、分枝の数、ほふく茎の長さ、ほふく茎の太さ、稈の太さ、節の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色、葉身のアントシアニン着色の強弱、穂の長さ、穂の幅、頴果の長さ、出穂期、紅葉の早晩（紅葉する品種に限る。）

表イレシネ　リンデニーの項中「イレシネ　リンデニー」を「イレシネ」に改め、同表ペレニアルライグラスの項中「けい光反応性」の次に「、雄性不稔性」を加え、同表ルクリアの項を次のように改める。

ルクリア	樹姿、樹高、樹姿の幅、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、節間長、葉全体の形、葉身先端部の形、葉身基部の形、葉縁の形、葉身の曲がり、葉縁の波打ち、葉身の長さ、葉身の幅、葉の表面の色、葉の裏面の色、葉の光沢、成葉表面の毛の有無、成葉裏面の毛の有無、成葉裏面の脈の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の色、つぼみの色、花序の形、花房の長径、花房の高さ、花房の花数、花形、花のタイプ、花の大きさ、花弁表面の色、花筒中間部の太さ、花筒の長さ、花筒の色、花弁全体の形、花弁先端の形、花弁の曲がり、花弁のしわ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の裂片数、副花冠の形、がくの長さ、がく全体の形、がくの色、柱頭のタイプ、花の香り、開花始期

表トマトの項を削り、同表メカルドニアの項を次のように改める。

メカルドニア	草姿、草丈、茎の長さ、茎の太さ、茎の色、茎の毛の有無、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の色、葉の斑の有無、葉の周縁部の形、葉の周縁部の鋸歯の粗密、花柄の長さ、花の長さ、花の幅、がくの形、がくの色、上唇弁の長さ、上唇弁の幅、上唇弁の形、上唇弁の先端の形、上唇弁の主な色、上唇弁の二次色の有無、上唇弁の二次色の型、上唇弁の二次色、下唇弁の中央裂片の長さ、下唇弁の中央裂片の幅、下唇弁の中央裂片の形、下唇弁の先端の形、下唇弁の主な色、下唇弁の二次色の有無、下唇弁の二次色の型、下唇弁の二次色、開花始期

表はすの項の次に次のように加える。

モズク	軸の長さ、軸の太さ、分枝の粗密、軸の褐色の濃淡、軸の硬さ、ぬめりの多少、収穫期の早晩、高水温適応性

表ふうらんの項を削り、同表タバコの項中「葉の支脈の中ろく」を「葉の支脈の中肋」に、「花の長さ」を「花の長さ（観賞用品種に限る。）」に、「花筒の直径」を「花筒の直径（観賞用品種に限る。）」に、「花筒の膨らみの強弱」を「花筒の膨らみの強弱（観賞用品種に限る。）」に、「花冠の大きさ」を「花冠の大きさ（観賞用品種に限る。）」に、「花冠の先端の尖り」を「花冠の先端の尖り（観賞用品種に限る。）」に改め、「果実の形」の次に「、立枯病抵抗性、疫病抵抗性、ＰＶＹ抵抗性、黒根病抵抗性、ＴＭＶ抵抗性、うどんこ病抵抗性」を加え、同表すいれん（ひつじぐさ）の項を次のように改める。

すいれん（ひつじぐさ）	花の咲く位置、株の広がり、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の周縁の形、葉身の基部裂片の重なり、新葉のアントシアニン着色の有無、新葉のアントシアニン着色の強弱、葉身の表面の色数、葉身の表面の地色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の大きさ、葉身の裏面の色数、葉身の裏面の地色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の二次色の大きさ、葉柄の色、花の数、花の大きさ、花の形、花型、花の色数、花の濃色花弁の分布状態、花柄の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の表面の色、がく片の裏面の色、がく片の裏面の条斑の有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の数、花弁の形、花弁の色の数、花弁の先端の形、花弁の表面の主な色、花弁の表面の模様、花弁の表面の二次色、花弁の色の変化の有無、雄ずいの数、雄ずい先端の色、花の香りの有無、むかご繁殖性の有無、一日当たりの開花の長さ（昼咲き品種に限る。）

表じゃのひげの項中「葉の湾曲の程度」を「葉の先端の下垂の強弱」に改め、同表稲の項を次のように改める。

稲	しょう葉のアントシアニンの着色の強弱、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じの粗密、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止葉の姿勢、後期の止葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外頴キールのアントシアニン着色の強弱、初期の外頴頂部下のアント