	シアニン着色の強弱、初期の外頴頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外頴の毛じの粗密、外頴先端の色、芒の色、穂の主軸の湾曲の程度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、頴の色、頴の模様、後期の外頴キールのアントシアニン着色の強弱、後期の外頴頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外頴頂部のアントシアニン着色の強弱、護頴の長さ、護頴の色、千粒重、籾の長さ、籾の幅、頴のフェノール反応の有無、頴のフェノール反応による着色の濃淡（フェノール反応のある品種に限る。）、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、穂いもちほ場抵抗性、葉いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現の程度（酒米品種に限る。）、グルテリン含量

表ぐチュニアの項中「花冠裂片の二次色の分布」を「花冠裂片の表面の二次色の分布」に、「花冠裂片の表面の脈の明瞭度」を「花冠裂片の表面の脈の明瞭度、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さ」に、「花筒の内面の脈の明瞭度」を「花筒の内面の脈の明瞭度」に改め、同表フロックスの項中「フロックス」を「フロックス（フロックス　パニキュラータを除く。）」に改め、同項の次に次のように加える。

フロックス　パニキュラータ	草丈、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の最大幅の位置、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の斑の有無、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の周縁の波打ちの強弱、花の数、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の強弱、花の直径、花被の有無、花筒の長さ、花筒の直径、花筒の色、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）、花冠裂片表面の二次色、花冠の目の有無、花冠の目の色、やくの色、花柱の色

表ほおずきの項の次に次のように加える。

テマリシモツケ	樹姿、樹高、樹幅、新梢のアントシアニン着色の強弱、枝の主な色、枝の横断面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の鋸歯の形、葉身の切れ込みの深さ、幼葉の表面の主な色、幼葉の裏面の主な色、成葉の表面の主な色、成葉の裏面の主な色、成葉の表面の斑の有無、成葉の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）、葉身の裏面の毛の有無、葉身の裏面の毛の粗密（毛のある品種に限る。）、葉柄の長さ、葉柄の色、花の直径、花弁の表面の主な色

表すべりひゆ（まつばぼたん）の項中「すべりひゆ（まつばぼたん）」を「まつばぼたん」に改め、同項の次に次のように加える。

すべりひゆ	草姿、草丈（草姿が半直立の品種に限る。）、株の幅、株の茎の数、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の色（斑入り品種に限る。）、葉身の周縁のアントシアニン着色の有無、葉柄の有無、花の仮雄ずいの弁化の有無、弁化した仮雄ずいの主な色、花の側面の形（仮雄ずいのない品種に限る。）、花の大きさ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の目の有無、花弁の目の色、花弁の色数（目を除く。）、花弁の主な色（目を除く。）、花弁の二次色（目を除く。）、花弁の二次色の分布（目を除く。）、花弁の三次色の分布（目を除く。）、花弁の先端の切れ込みの深さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柱のアントシアニン着色の強弱、開花始期

表プロテア　キナロイデスの項を次のように改める。

プロテア　キナロイデス	樹姿、樹高、株の幅、葉の発生密度、花基部からの側枝の発生の有無、木質塊茎の有無、主茎の太さ（木質塊茎のない品種に限る。）、主茎の色（木質塊茎のない品種に限る。）、直立葉の有無、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉の横断面の形、葉色、葉の毛じの有無、葉の毛じの密度、葉上面の主脈の明瞭度、葉上面の主脈の色、葉の周縁の波打ちの有無、葉の周縁の色、葉柄の有無、葉柄の長さ、花枝の長さ、花枝の太さ、花枝の硬さ、花枝の毛じの有無、花枝の毛じの密度、花枝の色、花基部の狭窄部の有無、花基部の狭窄部の長さ、花の厚さ、花の直径、花の厚さ／直径、花序の直径、総ほうの形状、花の主な色、外側総ほう片の見かけの長さ、外側総ほう片の長さ、外側総ほう片の幅、外側総ほう片の先端部の形、外側総ほう片の周縁の乾燥組織の有無、外側総ほう片の周縁の乾燥組織の幅、外側総ほう片の周縁の乾燥組織下部の色、外側総ほう片中央部の色、内側総ほう片の数、内側総ほう片の見かけの長さ、内側総ほう片の長さ、内側総ほう片の幅、内側総ほう片の形、内側総ほう片の先端部の形、内側総ほう片の先端部の内曲の強弱、内側総ほう片外側の先端部の色、内側総ほう片内側の先端部の色（キナロイデス種に限る。）、内側総ほう片外側の先端下部の色、内側総ほう片内側の先端下部の色（キナロイデス種に限る。）、内側総ほう片外側の毛じの有無、内側総ほう片外側の毛じの密度、内側総ほう片外側のろう質の有無、内側総ほう片の周縁のフリンジの有無、内側総ほう片の先端のタフトの有無、内側総ほう片の先端のタフトの色、内側総ほう片の先端のタフトの長さ、総ほう片の樹脂の有無、総ほう片の着生密度指数、総ほう片に対する花序の位置、花序の先端の形、花序の色、花被の長さ、花柱の長さ、二次的花粉表出部の接合部の明瞭度、二次的花粉表出部の長さ、開花期

表しゃりんばいの項を次のように改める。

しゃりんばい	樹姿、樹高、分枝の多少、枝の太さ、枝の色、新葉の主な色、新葉の鋸歯の有無、新葉の毛の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の横断面の形、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の表面の光沢の有無、葉身の鋸歯の有無、葉身の表面の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の毛の有無、花序の形、花序の長さ、花序の幅、一花序当たりの花数、つぼみの色、花型、花の直径、花の香りの有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の先端の形、花弁の表面の色数、花弁の表面の色の濃淡の分布、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色、花弁の表面の二次色の分布、花弁の周縁の切れ込みの有無、花弁の周縁の波打ちの有無、雄ずいの数、雌ずいの長さに対する雄ずいの長さ、がく片の形、がく片の色、小花柄の長さ、開花始期、果実の形、果実の直径、果実の色、成熟期