表じゅずさんごの項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| じゅずさんご | 樹高、枝のベタシアニン着色の有無、枝のベタシアニン着色の強弱（枝のベタシアニン着色がある品種に限る。）、枝の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉縁の波打ちの有無、葉の毛の粗密、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果房の長さ、一果房当たりの果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩 |

表セントポーリアの項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| セントポーリア | 草型、株張り（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。）、若葉裏面の葉脈間アントシアニン着色の有無、若葉裏面の葉脈間アントシアニン着色の強弱、若葉裏面の葉脈のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。）、葉の幅（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。）、葉型、葉の形、葉表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の斑の模様、葉裏面の葉脈間のアントシアニン着色の有無、葉裏面の葉脈間のアントシアニン着色の強弱、葉裏面の葉脈のアントシアニン着色の有無、葉の先端の形、葉の基部の形、葉の基部の重なりの有無、葉の周縁の波打ちの強弱、葉のしわの強弱、葉柄の長さ（標準型品種に限る。）、葉柄のアントシアニン着色の有無、花序の数（標準型品種に限る。）、一花茎当たりの花数（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。）、花柄の長さ（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。）、花柄のアントシアニン着色の有無、花柄のアントシアニン着色の強弱、花の直径（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。）、花の形、花型、花弁の数（八重咲品種に限る。）、花弁の周縁の波打ちの強弱、花弁の色数、花弁表面の周辺部の色（単色品種に限る。）、花弁表面の中央部の色（単色品種に限る。）、花弁表面の基部の色（単色品種に限る。）、花弁の主な色（複色品種に限る。）、花弁の二次色、二次色の分布する花弁、花弁の二次色の分布、開花の早晩（標準型品種及びミニチュア型品種に限る。） |

表スコパリアの項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| スコパリア | 草姿、草丈、茎の長さ、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の有無、茎の分枝の粗密、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉の斑の有無、葉の毛の有無、葉の香りの有無、花柄の長さ、花柄の毛の有無、花型、花の直径、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の有無、花冠裂片の表面の二次色の型、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の主な色に対する毛の色、花冠裂片の表面の主な色に対する花糸の色 |

表なす（ぼれいしょを除く。）の項中「ばれいしょ」を「トマト及びばれいしょ」に改め、同項の次に次のように加える。

| | |
|---|---|
| トマト | 一　草姿、子葉の形状、はい軸の色、茎の形状、第一花房下の葉数、花房間葉数、葉色、葉の着生角度その他葉の形状、根の太さ、花房の形状、花の形状、果実の色、果実表皮の色、果実横断面の形状その他果実の形状、果柄の形状及び果肉の色<br>二　早晩性、稔性、単為結果性、耐高低温性、耐肥性、品質劣化抵抗性、病害抵抗性及び虫害抵抗性<br>三　成分<br>四　前三号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木の難易、接ぎ木後の草勢及び台木の根の発育 |

表しもつけ（ゆきやなぎを除く。）の項中「（ゆきやなぎを除く。）」を削り、同表ゆきやなぎの項を削り、同表ティアレラの項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| ティアレラ | 草姿、葉群の高さ、株の幅、葉の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉の切れ込みの深さ、葉身の基部裂片の重なり、葉身の先端の形、葉身の表面の地色、葉身の表面の二次色の有無、葉身の表面の二次色（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）、葉身の表面の二次色の着色型（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）、葉身の表面の二次色の大きさ（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）、葉身の裏面の地色、葉身の表面の光沢の強弱、葉柄の長さ、葉柄の色、花茎の長さ、花茎のアントシアニンの着色の強弱、花序の形、花序の長さ、花序の幅、つぼみの色、花弁の長さ、花弁の幅、開花期 |

表ゆうぎりそうの項の次に次のように加える。

| | |
|---|---|
| ムラサキオモト | 草丈、株の幅、分枝の発生の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の横断面の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の緑色の濃淡、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の割合、葉の表面の斑の色、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の裏面のアントシアニン着色の強弱、開花の難易 |

表あかクローバの項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| あかクローバ | 種皮の色、倍数性、秋の草姿、は種当年の草高、二番草の草高、春の草高、生育型、子葉の長さ、子葉の幅、茎の長さ、茎の太さ、茎の節数、茎の毛の密度、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、は種当年の葉の色、葉の緑色の濃淡、葉斑の白さの強弱、花の色、は種当年の開花性、開花期、菌核病抵抗性 |

表しろクローバの項中「葉の密度」及び「開花性」の次に「（飼料用品種に限る。）」を加え、同表小麦の項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| 小麦 | 子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、草姿、反曲した止葉を持つ個体の出現頻度、出穂期、止葉の葉しょうの白粉の強弱、止葉の白粉の強弱、穂の白粉の強弱、稈の止葉下の白粉の強弱、草丈、穂首直下の節間の髄の程度、穂の形、粒着密度、穂の長さ、芒の有無、穂の先端の芒の長さ、穂の色、穂軸の先端凸部表面の毛の強弱、外頴の肩部の幅、外頴の肩部の形、外頴の嘴の長さ、外頴の嘴の形、外頴の内側の毛じの粗密、原麦粒の色、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡、播き性、Glu－Ａ１遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu－Ｂ１遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu－Ｄ１遺伝子座にある対立遺伝子の発現、稈の長さ、ふの色、粒の形、千粒重、うるち・もちの別、成熟期、粒質 |

表ヴァーレンベルギアの項を次のように改める。

| | |
|---|---|
| ヴァーレンベルギア　プロクムベンス | 草姿、草丈、株の幅、節間長、葉序、葉の形、葉の先端の形、葉の長さ、葉の幅、葉の鋸歯の有無、葉の鋸歯の粗密、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の毛の有無、花型、花冠の形、花冠の切れ込み、花冠裂片の形、花冠裂片の反りの有無、花冠裂片の反りの強弱、花冠の長さ、花冠の直径、花冠内面の主な色、花冠外面の主な色、花柄の長さ、花柄の毛の有無、花の数、開花時期 |