11　塩酸ヒドロキソコバラミン及び酢酸ヒドロキソコバラミンの一日最大分量及び一日最小分量は、ヒドロキソコバラミンに換算した量である。

12　アスコルビン酸カルシウム及びアスコルビン酸ナトリウムの一日最大分量及び一日最小分量は、アスコルビン酸に換算した量である。

13　クエン酸カルシウム、グリセロリン酸カルシウム、グルコン酸カルシウム、炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、乳酸カルシウム、リン酸水素カルシウム及び無水リン酸水素カルシウムの一日最大分量及び一日最小分量は、カルシウムに換算した量である。

14　クエン酸鉄アンモニウム及びフマル酸第一鉄の一日最大分量及び一日最小分量は、鉄に換算した量である。

15　エキスの場合の量は、原生薬に換算した量である。

16　トチュウの使用部位は、葉である。

別表第十四

区分	有効成分名	甲 最大濃度	甲 最小濃度	乙 最大濃度	乙 最小濃度
Ⅰ A項	塩酸クロルヘキシジン グルコン酸クロルヘキシジン液	○・二％	○・一％	○・一％	○・○一％
		○・二％	○・一％	○・一％	○・○一％
Ⅰ B項	イソプロピルメチルフェノール	—	—	○・一％	○・○一％
Ⅱ	d—カンフル dl—カンフル dl—メントール l—メントール	一〇％	一％	一％	○・一％
		一〇％	一％	一％	○・一％
		一〇％	一％	一％	○・一％
		一〇％	一％	一％	○・一％
Ⅲ A項	酢酸レチノール	二五〇〇国際単位パーグラム	五〇〇国際単位パーグラム	—	—
	パルチミン酸レチノール	二五〇〇国際単位パーグラム	五〇〇国際単位パーグラム	—	—
	ビタミンA油	二五〇〇国際単位パーグラム	五〇〇国際単位パーグラム	—	—
Ⅲ B項	酢酸トコフェロール トコフェロール	二％	○・四％	二％	二％
		二％	○・四％	二％	二％
Ⅲ C項	リボフラビン	—	—	○・○一％	○・○○一％
Ⅲ D項	塩酸ピリドキシン ジパルチミン酸ピリドキシン	—	—	○・一％	○・○一％
		—	—	○・一％	○・○一％
Ⅲ E項	エルゴカルシフェロール	—	—	一〇〇〇国際単位パーグラム	一〇〇国際単位パーグラム

	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ A項	Ⅵ B項	Ⅵ C項	Ⅵ D項
酸化亜鉛	—	—	—	—	—	—
尿素	—	—	—	—	—	—
クロタミトン	八％	五％	五％	〇・〇二％	二％ 一％ 一％	二％ 一・三％
ニコチン酸ベンジルエステル	○・二％	○・五％	○・五％	○・○○二％	○・二％ ○・一％ ○・一％	○・二％ ○・一三％
アラントイン グリチルリチン酸二カリウム サリチル酸メチル						
テレビン油 ユーカリ油						

（注）1　塩酸クロルヘキシジン及びグルコン酸クロルヘキシジン液の最大濃度及び最小濃度は、それぞれの濃度のグルコン酸クロルヘキシジンに換算した量である。

2　酢酸レチノール、パルチミン酸レチノール及びビタミンA油の最大濃度及び最小濃度は、ビタミンAに換算した量である。

別表第十五

区分	有効成分名	配合量の範囲（％）
Ⅰ	塩化カリウム	一・〇以上九九・〇以下
	塩化ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	塩化マグネシウム	一・〇以上九九・〇以下
	セスキ炭酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	炭酸水素ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	炭酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	乾燥炭酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	炭酸ナトリウム（無水）	一・〇以上九九・〇以下
	チオ硫酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	無水チオ硫酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	硫酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	乾燥硫酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	無水硫酸ナトリウム	一・〇以上九九・〇以下
	硫酸マグネシウム	一・〇以上九九・〇以下
Ⅱ	臭化カリウム	二・〇以上四・〇以下
	炭酸カルシウム	一・五以上一〇・〇以下
	軽質炭酸カルシウム	一・五以上一〇・〇以下
	沈降炭酸カルシウム	一・五以上一〇・〇以下
	硫酸アルミニウムカリウム	一・〇以上二〇・〇以下
	乾燥硫酸アルミニウムカリウム	一・〇以上二〇・〇以下
	硫酸アルミニウムカリウム（乾燥）	一・〇以上二〇・〇以下
	硫酸鉄	〇・〇五以上二〇・〇以下