	豚の腎臓	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.05ppm
	牛の食用部分	0.05ppm
	豚の食用部分	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.05ppm
	乳	0.01ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	にら（乾燥させたもの）	50ppm
	バジル（乾燥させたもの）	50ppm

第１食品の部Ａ食品一般の成分規格の項７の目の(1)の表のフルジオキソニルの項を削る。

第１食品の部Ａ食品一般の成分規格の項９の目の表のフルジオキソニルの項を削る。

第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項１試薬・試液の亜鉛の目の前に次の１目を加える。

DSS—d_6　$C_6H_9D_6NaO_3SSi$　国際単位系へのトレーサビリティが確保された３—（トリメチルシリル）—１—プロパン—１，１，２，２，３，３—d_6—スルホン酸ナトリウム。

第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項１試薬・試液の重水素化クロロホルム　ＮＭＲスペクトル測定用の目の次に次の１目を加える。

重水素化ジメチルスルホキシド　C_2D_6OS　NMRスペクトル測定用に製造したもの。

第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項１試薬・試液の定量用部分加水分解サポニンの目の次に次の１目を加える。

定量用フルジオキソニル　フルジオキソニル，定量用を見よ。

第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項１試薬・試液のプリリアントグリーンの目の次に次の１目を加える。

フルジオキソニル，定量用　$C_{12}H_6F_2N_2O_2$　本品は，無～白色の結晶又は白色の粉末である。

含量　本品は，フルジオキソニル（$C_{12}H_6F_2N_2O_2$）99.0%以上を含む。

確認試験　本品を赤外吸収スペクトル測定法中のペースト法又は臭化カリウム錠剤法により測定するとき，3,289cm^{-1}，2,223cm^{-1}，1,652cm^{-1}，1,530cm^{-1}及び1,236cm^{-1}のそれぞれの付近に吸収帯を認める。

融点　200～201℃

定量法　本品約20mg及びDSS—d_6約４mgをそれぞれ精密に量り，重水素化ジメチルスルホキシド２mlを加えて溶かす。この液を外径５mmのNMR試料管に入れ，密閉し，次の測定条件でプロトン共鳴周波数400MHz以上の装置を用いて^{1}H　NMRスペクトルを測定する。DSS—d_6のシグナルをδ０ppmとし，δ7.31～7.40ppm，δ7.56ppm及びδ7.85ppm付近のシグナル面積強度をそれぞれA_1（水素数３に相当），A_2（水素数１に相当）及びA_3（水素数１に相当）とするとき，（A_1／３）／A_2及び（A_1／３）／A_3及びA_2／A_3がそれぞれ1.0となることを確認する。DSS—d_6のシグナル面積強度を9.000としたときのA_1，A_2及びA_3の和をＩとし，水素数の和をＮ，DSS—d_6の純度をＰ（%）とし，次式によりフルジオキソニルの含量を求める。ただし，本品由来のシグナルに明らかな夾雑物のシグナルが重なる場合には，そのシグナル面積強度は定量に用いない。

$$\text{フルジオキソニル}（C_{12}H_6F_2N_2O_2）\text{の含量} = \frac{\text{DSS—}d_6\text{の採取量（mg）} \times \text{Ｉ} \times \text{Ｐ}}{\text{試料の採取量（mg）} \times \text{Ｎ}} \times 1.106\ (\%)$$

測定条件

スピニング　オフ

^{13}C核デカップリング　あり

取り込み時間　４秒以上

観測スペクトル幅　－５～15ppmを含む20ppm以上

パルス角　90°


繰り返しパルス待ち時間　60秒以上

ダミースキャン　１回以上

積算回数　８回以上

第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項11参照赤外吸収スペクトルのプチルアルデヒドの目の次に次の１目を加える。

フルジオキソニル



第２添加物の部Ｄ成分規格・保存基準各条の項プラックカーラント色素の目の次に次の１目を加える。

フルジオキソニル

Fludioxonil

