27　メタネフリン、心房性Ｎａ利尿ペプチド（ＡＮＰ）、メタネフリン・ノルメタネフリン分画　240点
28　プレグナントリオール、ノルメタネフリン　250点
29　インスリン様成長因子結合蛋白３型（ＩＧＦＢＰ－３）　280点
注　患者から１回に採取した血液を用いて本区分の11から29までに掲げる検査を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ　３項目以上５項目以下　410点
ロ　６項目又は７項目　630点
ハ　８項目以上　900点

Ｄ００９　腫瘍マーカー
１　尿中ＢＴＡ　80点
２　癌胎児性抗原（ＣＥＡ）　113点
３　α－フェトプロテイン（ＡＦＰ）、組織ポリペプタイド抗原（ＴＰＡ）、扁平上皮癌関連抗原（ＳＣＣ抗原）　115点
４　ＤＵＰＡＮ－２、ＮＣＣ－ＳＴ－439、ＣＡ15－３、前立腺酸ホスファターゼ抗原（ＰＡＰ）　130点
５　エラスターゼ１　135点
６　前立腺特異抗原（ＰＳＡ）、ＣＡ19－９　140点
７　塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ）、ＣＡ72－４、ＣＡ50、ＳＰan－１、シアリルＴｎ抗原（ＳＴＮ）、神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ）、ＰＩＶＫＡ－Ⅱ半定量、ＰＩＶＫＡ－Ⅱ定量　150点
８　核マトリックスプロテイン２２（ＮＭＰ２２）定性（尿）、核マトリックスプロテイン２２（ＮＭＰ２２）定量（尿）、シアリルＬｅˣ－ｉ抗原（ＳＬＸ）、ＣＡ125、サイトケラチン８・18（尿）　160点
９　シアリルＬｅˣ抗原（ＣＳＬＥＸ）、遊離型ＰＳＡ比（ＰＳＡ　Ｆ／Ｔ比）、ＢＣＡ225、Ⅰ型プロコラーゲン－Ｃ－プロペプチド（ＰＩＣＰ）、Ⅰ型コラーゲン－Ｃ－テロペプチド（ＩＣＴＰ）、ＳＰ１、抗ｐ53抗体　170点
10　サイトケラチン19フラグメント（シフラ）、ガストリン放出ペプチド前駆体（ＰｒｏＧＲＰ）　180点
11　遊離型フコース（尿）、ＣＡ602、α－フェトプロテインレクチン分画（ＡＦＰ－Ｌ３％）、ＣＡ54／61、癌関連ガラクトース転移酵素（ＧＡＴ）　190点
12　γ－セミノプロテイン（γ－Ｓm）、ＣＡ130、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント（ＨＣＧβ－ＣＦ）（尿）　200点
13　膵癌胎児性抗原（ＰＯＡ）　220点
14　癌胎児性抗原（ＣＥＡ）定性（乳頭分泌液）、癌胎児性抗原（ＣＥＡ）半定量（乳頭分泌液）、ＨＥＲ２蛋白（乳頭分泌液）、ＨＥＲ２蛋白　320点
15　可溶性インターロイキン－２レセプター（ｓＩＬ－２Ｒ）　460点
注１　診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して、腫瘍マーカーの検査を行った場合に、１回に限り算定する。ただし、区分番号Ｂ００１の３に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については算定しない。
２　患者から１回に採取した血液等を用いて本区分の２から15までに掲げる検査を２項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ　２項目　230点
ロ　３項目　290点
ハ　４項目以上　420点

Ｄ０１０　特殊分析
１　糖分析（尿）　38点
２　結石分析　120点
３　チロシン　200点
４　総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（ＢＴＲ）　300点
５　アミノ酸
イ　１種類につき　320点
ロ　５種類以上　1,274点
６　アミノ酸定性　350点
７　脂肪酸分画　450点
８　先天性代謝異常症検査　1,200点
注　当該保険医療機関内において、当該検査を行った場合に患者１人につき月１回に限り算定する。

（免疫学的検査）

Ｄ０１１　免疫血液学的検査
１　ＡＢＯ血液型、Ｒｈ（Ｄ）血液型　21点
２　Ｃｏｏｍｂｓ試験
イ　直接　30点
ロ　間接　34点
３　Ｒｈ（その他の因子）血液型　160点
４　不規則抗体　167点
注　第10部手術第７款の各区分に掲げる胸部手術、同部第８款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第９款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番号Ｋ８９８に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。
５　ＡＢＯ血液型関連糖転移酵素活性　200点
６　血小板関連ＩｇＧ（ＰＡ－ＩｇＧ）　210点
７　ＡＢＯ血液型亜型　260点
８　抗血小板抗体　270点

Ｄ０１２　感染症免疫学的検査
１　梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性、抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ）定性、抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ）半定量、抗ストレプトリジンＯ（ＡＳＯ）定量　15点
２　トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量　26点
３　抗ストレプトキナーゼ（ＡＳＫ）定性、抗ストレプトキナーゼ（ＡＳＫ）半定量　29点
４　梅毒トレポネーマ抗体定性、マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量　32点
５　連鎖球菌多糖体抗体（ＡＳＰ）、梅毒血清反応（ＳＴＳ）　34点
６　梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量　53点
７　アデノウイルス抗原定性（糞便）、迅速ウレアーゼ試験定性　60点
８　ロタウイルス抗原定性（糞便）、ロタウイルス抗原定量（糞便）　65点