表めキャベツの項を次のように改める。

めキャベツ	子葉の色、胚軸の色、草丈、着葉数、茎の長さ、茎の太さ、結球性、葉身の大きさ、葉身の長さ、葉身の色、葉身の色の濃淡、葉身のろう質の多少、葉身の湾曲、葉身の凹凸の強弱、葉柄の向き、葉身の長さに対する葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、芽球の縦断面の形、芽球の色、芽球の色の濃淡、芽球のしまり、芽球の着生間隔、収穫の早晩、芽球列の形、雄性不稔性

表アラキコスメの項中「草姿（叢生品種に限る。）、茎の数（叢生品種に限る。）」を「草姿（叢生型品種に限る。）、茎の数（叢生型品種に限る。）」に、「枝の粗密」を「株の粗密」に、「葉裂片の形（切れ込み葉の品種に限る。）」を「葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）」に、「舌状花の数、花盤の主な色（筒状花の開花前）、花盤の主な色（筒状花の開花後）」を「頭花の舌状花の数、花盤の主な色」に改め、同表ケアノツスの項を次のように改める。

ケアノツス	樹姿、樹高、枝の太さ、枝の色、枝の毛の有無、枝の着生角度、葉序、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の周縁部の形、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の種類、葉の斑の色、葉の表面の光沢の有無、葉の裏面の毛の密度、葉柄の長さ、花序の着き方、花序の直径、花序の高さ、一次小花序の数、一次小花序の花の数、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの色、開花時のがくの状態、花の直径、花弁の色、落葉性の有無、開花の早晩

表やこるまきく（セントウレア）の項の次に次のように加える。

ケンタウリウム　コンフェルツム	草丈、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、花の直径、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の二次色の分布、開花の早晩

表ケンタウリウムの項中「ケンタウリウム」を「ケンタウリウム　エリトラエア」に改め、「花冠裂片の表面の二次色」の次に「、開花の早晩」を加え、同表ぬまひのきの項を次のように改める。

ぬまひのき	樹高、株の幅、樹形、分枝の着生角度、樹皮の色、幹の太さ、分枝の長さ、分枝の粗密、葉の型、針状葉の長さ、針状葉の幅、針状葉の形、針状葉の先端の形、鱗状葉の側葉の長さ、鱗状葉の側葉の幅、鱗状葉の背腹葉の長さ、鱗状葉の背腹葉の幅、新葉の主な色、葉の主な色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の冬季の主な色

表きくの項中「舌状花の筒部の形(ロート形、さじ状及び管状の舌状花)」を「舌状花の筒部の形(ロート状、さじ状及び管状の舌状花)」に、「舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）」を「舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む。）」に、「舌状花の内花弁の表面の色（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）、舌状花の内花弁の裏面の色（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）」を「舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る。）」に改め、同表エピフィルムの項を次のように改める。

エピフィルム	一　草型及び草丈 二　茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三　花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花穂の花数及び花の香り 四　発芽期、開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

表トールフェスクの項及びメドウフェスクの項を次のように改める。

トールフェスク	倍数性、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の粗剛度、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、秋の出穂性、春化後の草高、出穂期、出穂期の草姿、出穂期の草高、最長稈の長さ、止め葉の長さ、止め葉の幅、穂の長さ
メドウフェスク	倍数性、栄養生長期の草姿、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、葉の緑色の濃淡、草丈、秋の出穂性、春化後の草高、出穂期、出穂期の草姿、出穂期の草高、茎の数、茎の長さ、最長稈の長さ、止め葉の長さ、止め葉の幅、穂数、穂の長さ

表メドウフェスクの項の次に次のように加える。

フェストロリウム	倍数性、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、春化前の草姿、葉の長さ、葉の幅、春化後の株幅、春化後の草姿、春化後の草高、出穂期、出穂期の草高、止め葉の長さ、止め葉の幅、最長稈の長さ、上部の節間長、穂の長さ

表ぐんしゃいの項の次に次のように加える。

ショウナンゴムノキ	分枝の多少、茎の太さ、節間長、茎の毛の有無、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の対称性、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、葉身の横断面の形、葉身の反りの強弱、葉身の周縁の波打ちの強弱、若葉の葉身の色数、若葉の葉身の色（単色葉の品種に限る。）、若葉の葉身の地色（２色以上の葉を持つ品種に限る。）、成葉の葉身の色数、成葉の葉身の色（単色葉の品種に限る。）、成葉の葉身の地色（２色以上の葉を持つ品種に限る。）、成葉の葉身の二次色（２色以上の葉を持つ品種に限る。）、成葉の葉身の二次色の分布（２色以上の葉を持つ品種に限る。）、成葉の葉身の三次色（３色以上の葉を持つ品種に限る。）

表アクシアの項中「葉身の周縁の切れ込みの深さ」の次に「、花柄のアントシアニン着色の強弱」を「花らいの幅」の次に「、花らいの形」を加え「がく片の曲がり」を「がく片の先端部の曲がり、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の外面の色数」に改め「がく片の外面の主な色」の次に「、がく片の外面の二次色（２色以上の品種に限る。）、がく片の外面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、がく片の外面の三次色（３色以上の品種に限る。）、がく片の外面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、がく片の内面の色数」を「がく片の内面の主な色」の次に「、がく片の内面の二次色（２色以上の品種に限る。）、がく片の内面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、がく片の内面の三次色（３色以上の品種に限る。）、がく片の内面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）」を「花の直径」の次に「、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の色の変化の有無、開花直後の花弁の外面の主な色、花弁の外面の色数」を「花弁の外面の主な色」の次に「、花弁の外面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花弁の外面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花弁の外面の三次色（３色以上の品種に限る。）、花弁の外面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、花弁の内面の色数」を「花弁の内面の主な色」の次に「、花弁の内面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花弁の内面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花弁の内面の三次色（３色以上の品種に限る。）、花弁の内面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）」を加え、同表大豆の項中「胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱」を「胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱」に、「子実の大きさ（一般群の品種に限る。）、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）」を「子