実の大きさ」に、「種皮の単色複色の別」を「種皮の色数」に、「種皮の二次色（複色品種に限る。）」を「種皮の二次色（２色以上の品種に限る。）」に、「胎座部の色」を「胎座残の色」に、「ダイズモザイクウイルス抵抗性」を「ダイズモザイクウイルス抵抗性（Ａ系統、Ａ２系統、Ｂ系統、Ｃ系統、Ｄ系統、Ｅ系統）」に改め、「ダイズシストセンチュウ抵抗性」の次に「、ハスモンヨトウ抵抗性」を加え、同表かすみそうの項を次のように改める。

かすみそう	植物体の基部の分枝の有無、草姿、草丈、茎の節数、節間長、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の色、葉の形、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の縦方向の反りの強弱、葉の横断面の形、葉の先端部の向き、葉の表面の色、花序の毛の有無、花の着生位置、花序の上部の形、花序の主茎に対する側枝の角度、花序の側枝の曲りの強弱、一茎当たりの花の総数、花型、花の直径、花弁の数、花の上部の形、やくの有無、小花柄の長さ、花弁の縦方向の湾曲、花弁の先端の形、花弁の色数、花弁の主な色、花弁の二次色、がく裂片の数、がくのアントシアニン着色の強弱、がくの縦断面の形、がく裂片の大きさ、開花始期

表くイビスカスの項の次に次のように加える。

アメリカフヨウ（クサフヨウ）	草姿、草丈、分枝の粗密、茎の太さ、茎の色、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の光沢の有無、葉身の表面の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、つぼみの色、花型、花冠の直径、一茎当たりの着花数、花冠の向き、花冠の開き方（一重又は半八重品種に限る。）、花弁の重なり（一重又は半八重品種に限る。）、花冠の形（八重品種に限る。）、花冠の高さ（八重品種に限る。）、花冠の目の有無、花冠の目の大きさ（目のある品種に限る。）、花冠の目の色（目のある品種に限る。）、花の香りの有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の切れ込みの有無、花弁のねじれの有無、花弁の周縁の波打ちの有無、花弁の表面の色数、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色（花弁の表面の色数が２以上の品種に限る。）、花弁の表面の三次色（花弁の表面の色数が３以上の品種に限る。）、花弁の表面の二次色の模様（花弁の表面の色数が２以上の品種に限る。）、花弁の表面の三次色の模様（花弁の表面の色数が３以上の品種に限る。）、がく筒の長さ、がく筒の太さ、がく筒の形、がく筒の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、小ほう片の長さ、小ほう片の幅、小ほう片の形、小ほう片の色、ずい柱の長さ、ずい柱の太さ、柱頭の色、やくの色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、開花始期

表大麦の項中「草姿」の次に「、稈の長さ」を加え、「のぎの先端のアントシアニン着色の強弱」を「芒の先端のアントシアニン着色の強弱、開閉花受粉性」に、「のぎの長さ」を「芒の長さ」に、「穀粒に比べた中央小穂ののぎを含む護えいの長さ」を「穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護頴の長さ」に、「穀粒の外えいのアントシアニン着色の強弱、穀粒の外えい背面内側面の脈沿いの突起の多少」を「穀粒の外頴のアントシアニン着色の強弱、穀粒の外頴背面内側面の脈沿いの突起の多少」に改め、「穀粒の糊粉層の色」の次に「、うるち・もちの別、穂発芽性、千粒重（原麦粒）」を「まき性」の次に「、穀粒硬度、麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）、コールバッハ数（ビール用品種に限る。）、ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無、βグルカン含量」を加え、同表リョーキリアヤハズチョウメの項中「葉身の表面の斑の色」を「葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）」に、「花の表面の二次色、花の表面の二次色の分布」を「花の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）」に改め、同表チガヤの項中「ほふく茎の長さ、ほふく茎の太さ」を「地下茎の長さ（薬用品種に限る。）、地下茎の太さ（薬用品種に限る。）」に改め、「葉身のアントシアニン着色の強弱」の次に「、穂の数」を「頴果の長さ」の次に「、出穂の難易」を加え、同表レタスの項中「子葉の形」の次に「、胚軸のアントシアニン着色の有無」を加え、「、草姿」を「、葉の姿勢」に、「球のしまり、球の大きさ」を「球のしまり（半結球、結球品種に限る。）、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）、球重（半結球、結球品種に限る。）」に、「球の縦断面の形」を「球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）、球葉数（カッティングタイプの品種を除く。）、総採葉数（カッティングタイプの品種に限る。）、茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）、葉の長さ、葉の幅、葉柄の基部の幅」に、「収穫期の草姿」を「収穫期の葉の姿勢」に、「葉の色相」を「外葉の色相」に改め、「葉脈の型」の次に「、芯の大きさ」を加え、「草丈」を「開花期の草丈」に改め、「レタスモザイクウイルス抵抗性」の次に「、根腐病菌レース１抵抗性、根腐病菌レース２抵抗性」を加え、同表イタリアンライグラスの項中「倍数性」の次に「、種子の千粒重」を加え、「最長稈の長さ」を「最長稈の長さ」に、「穂の基部の小穂の外頴の長さ」を「穂の基部の小穂の包頴の長さ」に、「雄性不稔性」を「雄性不稔性」に改め、「硝酸態窒素の濃度」の次に「、耐倒伏性」を加え、同表ペレニアルライグラスの項中「穂の基部の小穂の外頴の長さ」を「穂の基部の小穂の包頴の長さ」に改め、同表つるれいしの項を次のように改める。

つるれいし	胚軸の緑色の濃淡、主づるの節間長、主づるの太さ、側枝数、葉身の大きさ、葉身の緑色の濃淡、葉身裂片の長さ／幅、葉身裂片の先端部の形、葉身裂片の数、葉身の切れ込みの深さ、葉柄の長さ、主枝第１雌花の着生節位、子房の長さ、雄花の着生の多少、柱頭の緑色の濃淡、果実の長さ、果実の太さ、果実の縦断面の形、果実の果皮色、果実の肩部の形、果実の尻部の形、果実のこぶ状突起の多少、果実のこぶ状突起の大きさ、果実のこぶ状突起の先端部の形、果実のこぶ状突起のとげの有無、果実の条状突起の長さ、果実の完熟期の果皮の色、果実の苦味の有無、果実の苦味の強弱、種子の大きさ、種皮の褐色の濃淡、種皮の稜の突起の大小、着果習性、完熟期

表ミューレンベッキア　コハアレクサの項を次のように改める。

ミューレンベッキア	樹姿、分枝の多少、分枝の長さ、分枝の太さ、分枝の稲妻型屈曲の強弱、分枝のろう質の多少、分枝の基部の主な色、分枝の先端部の主な色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身のベタシアニン着色の強弱、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の主な色、葉柄の長さ

表ネメシアの項中「上唇弁の条の長さ」を「上唇弁の脈の長さ」に改め、同表稲の項中「初期の止葉の姿勢、後期の止葉の姿勢」を「初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢」に、「、芒の色」を「、後期の芒の色」に、「千粒重」を「籾の千粒重」に改め、「頴のフェノール反応による着色の濃淡（フェノール反応のある品種に限る。）」の次に「、玄米の千粒重」を加え、「胚乳の型、胚乳のアミロース含量」を「胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色」に、「穂いもちほ場抵抗性、葉いもちほ場抵抗性」を「葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性」に改め、同表おたねにんじんの項を次のように改める。

おたねにんじん	茎の数、茎の長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の位置、葉の数、葉柄の長さ、葉柄の花柄に対する姿勢、葉の表面の凹凸の強弱、葉の緑色の濃淡、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の形、小葉の横断面の形、小葉の周縁の鋸歯の強弱、開花期、花柄の長さ、花序の型、散形花序の最外周の小花の向き、果実の成熟期、果実の色、果実の形、紅葉した葉の色、主根の長さ、主根の太さ、主根の皮色、ほふく茎の有無、オタネニンジンエキス含量、サポニンの有無