表パッションフルーツの項を次のように改める。

パッションフルーツ	つるの色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身先端裂片の幅、葉身の切れ込みの深さ、葉身の緑色の濃淡、葉身の凹凸の有無、葉身の凹凸の強弱、葉柄の長さ、蜜腺の位置、ほう葉の長さ、がく片の長さ、がく片の幅、花の大きさ、花弁の長さ、花弁の幅、喉部の環状斑の色の濃淡、副花冠の直径、花糸の環状紫斑の有無、花糸の環状紫斑の幅、花糸の環状紫斑の色の濃淡、花糸の先端部の斑点の有無、果実の大きさ、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果皮の色、果点の明瞭さ、果皮の厚さ、種子の大きさ、珠柄の色、果肉の色、果汁の多少、果実の甘味、果実の酸味、収穫始期、収穫期

表べにばないんげんの項を次のように改める。

べにばないんげん	胚軸のアントシアニン着色の有無、草型、草丈（矮性品種に限る。）、つるの伸長開始期（つる性品種に限る。）、つる伸長の速さ（つる性品種に限る。）、葉の地色、葉の色の濃淡（葉が緑色の品種に限る。）、葉の凹凸の強弱、先端小葉の大きさ、先端小葉の形、先端小葉の先端の形、旗弁の色、翼弁の色、さやの長さ、さやの幅、さやの緑色の濃淡、さやの縫合部のすじの有無、さやの曲がりの強弱、さやの曲がり方、さやの先端の形、さやの表面の粗滑、さやの嘴の長さ、さやの嘴の曲がりの強弱、さやのくびれ、一さや内粒数、百粒重、種子の縦断面の形、種子の横断面の形、種子の色数、種子の主な色、種子の二次色（種子が複色の品種に限る。）、種子の二次色の分布（種子が複色の品種に限る。）、種子の脈模様（種子の主な色が白の品種に限る。）、種子の環色、開花期、成熟期

表だらおうの項の次に次のように加える。

リプサリドプシス	草姿、二次葉状茎の数、葉状茎の長さ、葉状茎の幅、葉状茎の色、葉状茎の縁部の赤色の強弱、葉状茎の翼の発達の強弱、葉状茎の翼の大きさ、葉状茎の毛の密度、１㎝長のつぼみの先端の色、１㎝長のつぼみの先端の色の濃淡、1.5㎝長のつぼみの先端の形、花の直径、花被片の幅、花被片の基部の斑の大きさ、花被片の斑の色、花被片の中間部の色の違いの有無、花被片の中間部の色、花被片の色の境界の明瞭度（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色が占める割合（花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。）、花被片の周縁部の色、雄ずいの長さ、花糸の色、花柱の長さ、柱頭の色、子房の色、開花始期、開花期間

表きいちご類の項中「きいちご類」を「きいちご類（ラズベリーを除く。）」に改め、同項の次に次のように加える。

ラズベリー	樹姿、新梢の多少、若枝先端部のアントシアニン着色の有無、若枝先端部のアントシアニン着色の強弱、新梢の白粉の多少、新梢のアントシアニン着色の強弱、新梢の節間長、新梢の葉芽の長さ、前年枝の長さ（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の長さ（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の色（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、とげの有無、とげの多少（とげのある品種に限る。）、とげの基部の大きさ（とげのある品種に限る。）、とげの長さ（とげのある品種に限る。）、とげの色（とげのある品種に限る。）、葉の表面の緑色の濃淡、小葉の数、小葉の横断面の形、葉のしわの強弱、側小葉の重なり、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、小花柄のとげの数、花柄のアントシアニン着色の有無、花柄のアントシアニン着色の強弱、花の大きさ、結果枝の向き（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、結果枝の長さ（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の形、小核果数、果実の小核果の大きさ、果実の色、果実の光沢の強弱、果肉の硬さ、果床の大きさ、小核果の果床への接着の強弱、結実期、葉芽の萌芽期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の発生時期（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の開花始期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の開花始期（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の果実の成熟期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の果実の成熟期（秋に新梢に結実する品種に限る。）、前年枝の果実の収穫期間（夏に前年枝に結実する品種に限る。）、新梢の果実の収穫期間（秋に新梢に結実する品種に限る。）

表みやましきみの項を次のように改める。

みやましきみ	樹姿、樹高、枝の緑色の濃淡、枝のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、葉身の横断面の形、葉身の反りの強弱、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色、葉身の表面の斑の模様、葉柄の長さ、葉柄の緑色の濃淡、葉柄のアントシアニン着色の強弱、花の雌雄性、花の密度、花序の長さ、花序の幅、花序の形、つぼみの色、花の直径、花弁の数、花の香りの強弱、雌性不稔性、花弁の形、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花弁の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花弁の裏面の主な色、花弁の裏面の二次色（２色以上の品種に限る。）、花弁の裏面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、花柄の緑色の濃淡、花柄のアントシアニン着色の強弱、花糸の色、花粉の色、子房の色、一花序当たりの着果数、果実の大きさ、果実の形、果実の色

表ばれいしょの項を次のように改める。

ばれいしょ	幼芽の大きさ、幼芽の形、幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合、幼芽の基部の毛の多少、幼芽の頂部の基部に対する大きさ、幼芽の頂部の型、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱、幼芽の頂部の毛の多少、幼芽の根端の数、幼芽の側枝の長さ、植物体の草型、植物体の草姿、茎のアントシアニン着色の強弱、複葉の大きさ、小葉の重なり、二次小葉の出現度、複葉の緑色の濃淡、複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱、第二側小葉の長幅比、頂小葉と側小葉の合着の出現率、花芽のアントシアニン着色の強弱、植物体の草高、花の数、花房の大きさ、花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の大きさ、花冠内面のアントシアニン着色の強弱、花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合、花冠内面のアントシアニン着色の広がり、やくの色、早期肥大性、枯ちょう期、塊茎の形、塊茎の目の数、塊茎の目の深さ、塊茎の皮色、塊茎の目の基部の色、塊茎の表皮のネット、塊茎の肉色、塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）、休眠期間、上いも重、上いも数、上いもの平均重、肉質、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性

表タゲテス（マリーゴールド）の項を次のように改める。

タゲテス（マリーゴールド）	胚軸のアントシアニン着色の有無、香りの有無、草丈、草姿、分枝性、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、葉型、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、先端小葉の幅（羽状複葉の品種に限る。）、葉の裂片縁部の重なりの有無（羽状複葉の品種に限る。）、葉縁の切れ込みの深さ、花柄の長さ、小花の型、頭花の直径、舌状花の列数（舌状花型品種に限る。）、舌状花の形、舌状花の切れ込みの有無、舌状花の切れ込みの深さ、舌状花の先端の形（切れ込みのない品種に限る。）、舌状花の長さ、舌状花の幅、頭花の色数、頭花の色（頭花の色数が１色の品種に限る。）、筒状花の表面の色数（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、筒状花の表面の主な色（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、筒状花の表面の二次色（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、筒状花の裏面の色、丁字状花の表面の色数（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、丁字状花の表面の主な色（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、丁字状花の表面の二次色（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、丁字状花の裏面の色、舌状花の表面の色数（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の主な色（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の二次色（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の色の分布（頭花の色数が２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の中心部の色の面積（舌状花の色の分布が１型の品種に限る。）、舌状花の裏面の主な色、開花始期