表ケラトステイグマ　ウィルモッティアヌム（るりまつりもどき）の項の次に次のように加える。

ケレウス	株の高さ、株の幅、分枝の多少、分枝の型、茎の主な色、茎の斑の有無、茎の斑の色（斑のある品種に限る。）、稜の乱れの有無、刺座の間隔、刺座の直径、刺座の形、刺座の色、刺の有無、刺の数、刺の長さ、刺の硬さ、刺の基部の色、刺の先端の色

表シクラメンの項の次に次のように加える。

つたがらくさ	分枝性、茎の長さ、節間長、茎のアントシアニン着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の表面の緑色の濃淡（単色品種に限る。）、葉身の表面の主な色（複色品種に限る。）、葉身の表面の二次色（複色品種に限る。）、葉身の表面の三次色（複色品種に限る。）、葉身の先端の形、葉身の周縁の切れ込みの深さ、葉身の表面の毛の有無、花冠の縦径、花冠の横径、下唇弁の中央裂片の湾曲の向き、下唇弁の中央裂片の主な色、下唇弁の基部の突起の色、上唇弁の条線の有無、上唇弁の条線の色、距の色、開花始期

表ダリアの項中「葉脈の隆起の高低」を「葉の葉脈の凹凸」に、「副弁の頭花に対する長さ」を「舌状花に対する副弁の長さ」に、「舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の二次色の分布位置、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布位置、舌状花の表面の三次色の型」を「舌状花の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の二次色の分布位置（２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の二次色の型（２色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の三次色（３色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の三次色の分布位置（３色以上の品種に限る。）、舌状花の表面の三次色の型（３色以上の品種に限る。）」に改め、同表かきの項中「かき」を「かきのき」に、「果頂の溝の明瞭度、果頂の条紋の明瞭度」を「果頂の溝の明瞭度、果頂の条紋の明瞭度」に、「へたの果実に対する大きさ」を「果実に対するへたの大きさ」に改め、「果皮の色」の次に「、果肉の粗密、果肉の硬さ」を加え、「果肉の褐斑の有無、果肉の褐斑の大きさ」を「果肉の褐斑の有無、果肉の褐斑の大きさ」に、「果実の渋味」を「甘渋性、脱渋の難易」に改め、同表そば及びファツヘデラの項を次のように改める。

そば	倍数性、子葉のアントシアニン着色の強弱、茎のアントシアニン着色の強弱、花芽のアントシアニン着色の強弱、伸育性、草丈、葉身の基部の形、葉の緑色の濃淡、花の大きさ、花弁の色、小花柄の長さ、花房の数、分枝の数、茎の長さ、茎の節数、茎の直径、子実の長さ、子実の長幅比、子実の形、乳熟後期の果皮の色、完熟粒の果皮の色、丸抜きの色、千粒重、容積重、子実の外観品質、生態型、開花始期、開花最盛期、成熟期、耐倒伏性、穂発芽性、脱粒性、ルチン含量
ファツヘデラ	茎の長さ、茎の太さ、分枝性、節間長、茎の色、葉の形、葉の切れ込みの数、葉の切れ込みの深さ、葉の基部裂片全体の形、葉の側裂片全体の形、葉の頂裂片全体の形、葉の側裂片先端の形、葉の頂裂片先端の形、葉の基部の形、葉の周縁の形、葉のよじれの強弱、葉の周縁の波打ちの強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉の厚さ、新葉の表面の色、葉の表面の色、葉の裏面の色、葉脈の色、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色数（斑のある品種に限る。）、葉の斑の主な色（斑のある品種に限る。）、葉の斑の二次色（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色の変化性（斑のある品種に限る。）、葉の光沢の強弱、葉の毛の有無、葉柄の長さ、葉柄の上面の色、葉柄の下面の色、葉柄の毛の有無

表やまももそうの項を次のように改める。

やまももそう	草丈、株幅、草丈／株幅、茎の粗密、花数、茎の傾き、分枝数、葉数、葉の着生位置、新しょうのアントシアニン着色の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の最大幅の位置、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の分布（斑のある品種に限る。）、葉の斑の割合（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン着色の分布、葉のアントシアニン着色の割合、花柄のアントシアニン着色の強弱、花柄のアントシアニン着色の分布、つぼみの色、花の幅、上弁の形、上弁の長さ、上弁の幅、上弁の長さ／幅、上弁の表面の主な色、上弁の表面の二次色（脈を除く。）、上弁の表面の二次色の分布（脈を除く。）、上弁の脈の明瞭度、花柱の色、花糸の色、花色の変化

表ユタスの項中「球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る。）」を「球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）」に、「球葉数（カッティングタイプの品種を除く。）、総採葉数（カッティングタイプの品種に限る。）」を「球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）、総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）」に改め、同表ゆりの項を次のように改める。

ゆり	草丈、茎のアントシアニン着色の強弱、葉の数、葉序、葉の長さ、葉の幅、葉の斑の有無、葉の表面の光沢の強弱、葉の横断面の形、つぼみの主な色、花序の型、花序の花数、花序の毛の強弱、花型、花被の向き（小花柄を除く。）、花被の形（小花柄を除く。）、花の香り、花被片の長さ、花被片の幅、花被片の肋状組織の強弱、花被片の周縁の波打ちの強弱、花被片の周縁の波打ちの型、花被片の外反の強弱、花被片の中央部の主な色、花被片の基部の主な色、花被片の蜜腺に接する部分の色、花被片の先端部分の主な色、花被片の縁部の主な色、花被片の外面の主な色、花被片の蜜腺の色、花被片の乳頭突起又は斑点の数、花被片の乳頭突起又は斑点の範囲の大きさ、花被片の乳頭突起又は斑点の色、雄ずいの長さ、花糸の主な色、やくの色、花粉の色、花柱の主な色、柱頭の色、開花期

表リナリアの項の次に次のように加える。

やぶらん	草姿、葉群の高さ、株の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の先端の形、葉の外曲の強弱、葉の緑色の濃淡、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）、花茎の長さ、花茎の色、葉に対する花序の位置、花序の形、花序の長さ、花序の幅、花序の花の粗密、小花柄の長さ、つぼみの色、花被片の表面の色、開花始期

表ロマンドラ　ロンギフォリアの項を次のように改める。

ロマンドラ　ロンギフォリア	草姿、葉部の高さ、葉群の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉のろう質の強弱、葉の硬さ、葉の横断面の形、葉の先端の中央突起の位置、葉の基部の縁の褐色の濃淡、花序の長さ、花穂の位置、花柄の色、花穂の長さ、ほう葉の長さ、がくの色、花冠の色

表アセロラの項を次のように改める。

アセロラ	樹姿、樹勢、枝の発生密度、節間長、枝の太さ、新しょうの毛じの粗密、葉身の長さ、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端の形、葉身の表面の緑色の濃淡、やくに対する柱頭の位置、花柱の湾曲、花弁の周縁の波打ちの強弱、花弁の桃色の濃淡、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の重さ、果実の形、果実の条溝の深さ、果頂部のくぼみの深さ、果頂部のくぼみの幅、梗あ部の深さ、梗あ部の幅、果柄の長さ、果皮の主な色、果肉の色、果実の酸味、果汁の多少、核の大きさ、核の褐色の濃淡