表ストックの項の次に次のように加える。

はりつるまさき	樹姿、枝の長さ、枝の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の形、葉身の横断面の形、新葉の表面の主な色、新葉の表面の斑の有無、新葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、新葉の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉柄の長さ

表おしろいばなの項の次に次のように加える。

すすき	草姿、草丈、葉群の高さ、茎の数、稈の長さ、節数、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身の形、葉身の反りの位置、葉身の横断面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）、中肋の色、穂の形、穂の長さ、穂の一次枝梗の数、穂の一次枝梗の長さ、小穂の長さ（毛、芒を除く。）、小穂の毛の長さ、小穂の毛の色、ほう頴の色、芒の有無、芒の長さ、出穂期

表まつよいぐさの項を次のように改める。

まつよいぐさ	草丈、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の基部のアントシアニン着色の有無、茎の毛の基部のアントシアニン着色の強弱、ロゼット葉の長さ、ロゼット葉の幅、ロゼット葉の緑色の濃淡、ロゼット葉の葉縁の波打ちの強弱、ロゼット葉の表面の凹凸の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉縁の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、花らいの大きさ、花らいのアントシアニン着色の有無、花の大きさ、花弁の有無、花弁の先端の形、花弁の地色、花弁の模様、花弁の模様の色、花弁のしぼんだ時の地色の変化の有無、柱頭の位置、花糸の色、さく果の長さ、さく果のアントシアニン着色の有無、さく果の着生密度、抽だいの早晩、開花の早晩、昼咲き性の有無

表稲の項中「しょう葉のアントシアニンの着色の強弱」を「しょう葉のアントシアニン着色の強弱」に、「初期の外頴キールのアントシアニン着色の強弱」を「初期の外頴のキールのアントシアニン着色の強弱」に、「穂の主軸の湾曲の程度」を「穂の主軸の湾曲度」に、「後期の外頴キールのアントシアニン着色の強弱」を「後期の外頴のキールのアントシアニン着色の強弱」に改め、「（フェノール反応のある品種に限る。）」を削り、「精玄米の心白の発現の程度（酒米品種に限る。）」を「精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）」に改め、「グルテリン含量」の次に「、カドミウム吸収性」を加え、同表しゃくやくの項を次のように改める。

しゃくやく	ほう芽期、芽の形、芽の色、草型、草丈、茎の数、茎の太さ、節間長、分枝の多少、茎葉の毛の多少、葉の大きさ、複葉の形、頂小葉の形、葉の緑色の濃淡、葉縁の波打ちの有無、葉の光沢の強弱、葉の厚さ、葉の垂れ、抽だいの難易（薬用品種に限る。）、花首の長さ、花首の太さ、花首のアントシアニン着色の強弱、開花始めの花色、満開時の花色、花の大きさ、花の形、内弁の色（翁咲品種に限る。）、花弁数（一重・金しべ・翁咲品種を除く。）、花弁のぼかしの有無、花弁の絞りの多少、花弁先端の形、花弁の長さ、花弁の幅、雄しべの多少、雌しべの多少、雌しべの状態、柱頭の先端の形、柱頭の色、子房の毛の多少、開花期、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）、乾燥根の横断面の色（薬用品種に限る。）、ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）

表あかまつの項の次に次のように加える。

ごようまつ	樹型、樹冠の形、樹高、枝の太さ、枝の着生角度、枝の着生密度、針葉束当たりの針葉の数、針葉の長さ、針葉の幅、針葉の先端の形、針葉の先端の屈曲の有無、針葉のねじれの多少、針葉の曲りの強弱、針葉の夏の主な色、針葉の斑の有無、針葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、針葉の斑の型（斑のある品種に限る。）、針葉の冬の主な色、針葉の色の季節変化、雄花の色、雌花の色、球果の長さ、球果の幅、球果の形、球果の色、種子の長さ、種子の幅、種子の形、種子の色、種子に対する種翼の長さ、種翼の色

表ピティロディア　テルミナリスの項を次のように改める。

ピティロディア　テルミナリス	草姿、草丈、開花枝の長さ、開花枝の太さ、節数、節間長、開花枝の毛の多少、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の縦断面の形、葉の横断面の形、葉の毛の多少、着花節部の長さ、着花節数、花数、花冠の縦径、花冠の横径、花冠筒部の長さ、花冠筒部の外面の色、花冠筒部の内面の斑点の有無、花冠筒部の内面の斑点の色、花冠裂片の色、花冠裂片の模様の有無、花冠裂片の毛の多少、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の有無、がくの毛の多少

表すぐりぐゆの項中「株の茎の数」を「茎の数」に、「葉身の斑の色（斑入り品種に限る。）」を「葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）」に、「花の仮雄ずいの弁化の有無」を「仮雄ずいの弁化の有無」に、「花の側面の形（仮雄ずいのない品種に限る。）」を「花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）」に、「花弁の二次色（目を除く。）、花弁の二次色の分布（目を除く。）、花弁の三次色の分布（目を除く。）」を「花弁の二次色（目を除く。）（２色以上の品種に限る。）、花弁の二次色の分布（目を除く。）（２色以上の品種に限る。）、花弁の三次色の分布（目を除く。）（３色以上の品種に限る。）」に改め、同表さくらの項の次に次のように加える。

すもも（日本すももを除く。）	一　樹姿、樹の大きさ及び樹勢 二　枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、芽の形、葉形、葉の毛じの多少、葉の大きさ、葉色及び蜜腺の形 三　花形、花の大きさ、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の数、雌ずいの数、雌ずいの健否、雄ずいの色、花粉の多少、がく筒内壁の色、がくの形、がくの色及び花柄の長さ 四　果形、果実の大きさ、果皮の色、果粉の多少、果肉の色、肉質、果汁の多少、甘味、酸味、渋味、苦味、香気、核と果肉の粘離、核の形、核の大きさ、核の色及び核の紋 五　開花期、発芽期、落葉期、成熟期、結果性、果実の着色の難易、生理落果の多少、裂果性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六　前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては接ぎ木の難易、実生のそろい、栄養繁殖の難易、接ぎ木後の樹勢、台木の根の発育、耐干性及び耐湿性

表すももの項中「すもも」を「日本すもも」に改め、同表はなかんざし（ローダンセ）の項の次に次のように加える。

ローダンセマム	草型、草丈、株の幅、茎の太さ、節間長、節数、一次分枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉片の幅、葉の表面の毛の密度、花の直径、花盤の直径、花盤の主な色、舌状花の向き、舌状花の数、舌状花の形、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。）、舌状花の裏面の主な色、舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）、花粉の有無、開花始期