	コーヒー豆	0.2ppm
	牛の筋肉	0.05ppm
	豚の筋肉	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05ppm
	牛の脂肪	0.05ppm
	豚の脂肪	0.05ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.05ppm
	牛の肝臓	0.5ppm
	豚の肝臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.5ppm
	牛の腎臓	0.5ppm
	豚の腎臓	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.5ppm
	牛の食用部分	0.5ppm
	豚の食用部分	0.5ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.5ppm
	乳	0.05ppm
	鶏の筋肉	0.05ppm
	その他の家きんの筋肉	0.05ppm
	鶏の脂肪	0.05ppm
	その他の家きんの脂肪	0.05ppm
	鶏の肝臓	0.05ppm
	その他の家きんの肝臓	0.05ppm
	鶏の腎臓	0.05ppm
	その他の家きんの腎臓	0.05ppm
	鶏の食用部分	0.05ppm
	その他の家きんの食用部分	0.05ppm
	鶏の卵	0.05ppm
	その他の家きんの卵	0.05ppm
	とうがらし（乾燥させたもの）	10ppm

第1のAの6の(1)の表のレピメクチンの項を次のように改める。

レピメクチン	大豆	0.01ppm
	かんしょ	0.01ppm
	だいこん類の根	0.01ppm
	だいこん類の葉	0.3ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	ケール	1ppm
	こまつな	1ppm
	きょうな	0.3ppm
	チンゲンサイ	1ppm
	カリフラワー	0.2ppm
	ブロッコリー	0.05ppm
	その他のあぶらな科野菜	1ppm
	レタス	1ppm
	ねぎ	0.01ppm
	トマト	0.3ppm
	ピーマン	0.1ppm
	なす	0.2ppm
	メロン類果実	0.01ppm
	ほうれんそう	2ppm
	えだまめ	0.1ppm
	みかん	0.01ppm
	なつみかんの果実全体	0.1ppm
	レモン	0.1ppm
	オレンジ	0.1ppm
	グレープフルーツ	0.1ppm
	ライム	0.1ppm
	その他のかんきつ類果実	0.1ppm
	りんご	0.2ppm
	日本なし	0.2ppm
	西洋なし	0.2ppm
	もも	0.01ppm
	おうとう	0.2ppm
	いちご	0.5ppm
	ぶどう	0.3ppm
	茶	0.3ppm
	その他のスパイス	0.3ppm
	その他のハーブ	1ppm
	魚介類	0.02ppm

第1のAの7の(1)の表中TCMTBの項、アバメクチンの項、セデカマイシンの項、ピリダベンの項及びフルトリアホールの項を削る。

第2のCの1のDSS—d_6の目の前に次の1目を加える。

1，4－BTMSB—d_4　$C_{12}H_{18}D_4Si_2$　国際単位系へのトレーサビリティが確保された重水素化1，4—ビス（トリメチルシリル）ベンゼン。

第2のCの1のアセトンの目の次に次の1目を加える。

アゾキシストロビン，定量用　$C_{22}H_{17}N_3O_5$　本品は，白色の粉末である。

含量　本品は，アゾキシストロビン（$C_{22}H_{17}N_3O_5$）99.0%以上を含む。

確認試験　本品を赤外吸収スペクトル測定法中のペースト法又は臭化カリウム錠剤法により測定するとき，2,230cm^{-1}，1,625cm^{-1}，1,587cm^{-1}，1,201cm^{-1}，1,155cm^{-1}及び840cm^{-1}のそれぞれの付近に吸収帯を認める。

融点　115～119℃