すいか	2 ppm
メロン類果実	2 ppm
まくわうり	0.4ppm
その他のうり科野菜	0.4ppm
ほうれんそう	9 ppm
オクラ	0.4ppm
えだまめ	5 ppm
その他の野菜	4 ppm
りんご	1 ppm
日本なし	0.5ppm
西洋なし	0.5ppm
マルメロ	0.2ppm
びわ	0.2ppm
もも	1 ppm
ネクタリン	1 ppm
あんず	2 ppm
すもも	0.6ppm
うめ	2 ppm
おうとう	2 ppm
いちご	2 ppm
ぶどう	5 ppm
その他の果実	0.4ppm
綿実	0.5ppm
茶	40ppm
ホップ	5 ppm
その他のハーブ	16ppm
牛の筋肉	0.08ppm
その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の筋肉	0.08ppm
牛の脂肪	0.03ppm
その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の脂肪	0.03ppm
牛の肝臓	0.08ppm
その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の肝臓	0.08ppm
牛の腎臓	0.08ppm
その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の腎臓	0.08ppm
牛の食用部分	0.08ppm
その他の陸棲（せい）哺乳類に属する動物の食用部分	0.08ppm
乳	0.03ppm
鶏の筋肉	0.03ppm
その他の家きんの筋肉	0.03ppm
鶏の脂肪	0.03ppm
その他の家きんの脂肪	0.03ppm
鶏の肝臓	0.03ppm
その他の家きんの肝臓	0.03ppm
鶏の腎臓	0.03ppm
その他の家きんの腎臓	0.03ppm
鶏の食用部分	0.03ppm
その他の家きんの食用部分	0.03ppm
鶏の卵	0.04ppm
その他の家きんの卵	0.04ppm
トマトピューレー（トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。）	0.5ppm
トマトペースト（トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。）	2 ppm

第1のAの6の(1)の表のベンチアバリカルブイソプロピルの項を次のように改める。

ベンチアバリカルブイソプロピル	大豆	0.05ppm
	ばれいしょ	0.02ppm
	はくさい	2 ppm
	キャベツ	0.05ppm
	たまねぎ	0.02ppm
	ねぎ	0.7ppm
	アスパラガス	0.3ppm
	その他のゆり科野菜	0.05ppm
	トマト	2 ppm
	なす	2 ppm
	きゅうり	0.5ppm
	かぼちゃ	0.3ppm
	すいか	0.05ppm
	メロン類果実	0.05ppm
	ぶどう	2 ppm

第1のAの7の(1)の表中塩酸ホルメタネートの項及びピリメタニルの項を削る。

第2のCの1の重水素化ジメチルスルホキシドの目の次に次の1目を加える。

重水素化メタノール　CD_3OD　NMRスペクトル測定用に製造したもの。

第2のCの1の定量用ネオテームの目の次に次の1目を加える。

定量用ピリメタニル　ピリメタニル，定量用を見よ。

第2のCの1のピリジン・ピラゾロン試液の目の次に次の1目を加える。

ピリメタニル，定量用　$C_{12}H_{13}N_3$　本品は，白色の結晶性の粉末である。

含量　本品は，ピリメタニル（$C_{12}H_{13}N_3$）99.0%以上を含む。

確認試験　本品を赤外吸収スペクトル測定法中の臭化カリウム錠剤法により測定するとき，3,263 cm^{-1}，1,588cm^{-1}，1,496cm^{-1}，1,251cm^{-1}，757cm^{-1}及び715cm^{-1}のそれぞれの付近に吸収帯を認める。