⑬　バシトラシン

Bacillus subtilis var. *Tracy*の培養により得られるバシトラシンA（$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$）を主成分とするもの又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。

⑭　バージニアマイシン

*Streptomyces virginiae*の培養により得られるバージニアマイシンM_1（$C_{28}H_{35}N_3O_7$）及びバージニアマイシンS（$C_{43}H_{49}N_7O_{10}$）から成るもの又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。

⑮　ビコザマイシン

*Streptomyces griseoflavus*の培養により得られるビコザマイシン（$C_{12}H_{18}N_2O_7$）又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。

⑯　フラボフォスフォリポール

*Streptomyces bambergiensis*の培養により得られるフラボフォスフォリポール（$C_{65\sim75}H_{124\sim135}N_{6\sim7}O_{40\sim42}P$）又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。

⑰　モネンシン

*Streptomyces cinnamonensis*の培養により得られるモネンシンA（$C_{36}H_{62}O_{11}$）を主成分とするもの又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。

⑱　ラサロシド

*Streptomyces lasaliensis*の培養により得られるラサロシド（$C_{34}H_{54}O_8$）又はその他の方法により得られるこれと同一の物質をいう。

各抗菌性物質の力価の定義

①　アビラマイシン

アビラマイシンの力価は、アビラマイシンA（$C_{61}H_{88}Cl_2O_{32}$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準アビラマイシン1μgに相当する。

②　エフロトマイシン

エフロトマイシンの力価は、エフロトマイシンA_1（$C_{59}H_{88}N_2O_{20}$）としての量を質量(力価）で示す。1μg（力価）は、標準エフロトマイシン1μgに相当する。

③　エンラマイシン

エンラマイシンの力価は、一塩酸エンラマイシン〔一塩酸エンラマイシンA（$C_{107}H_{138}Cl_2N_{26}O_{31}$・HCl）58%、一塩酸エンラマイシンB（$C_{108}H_{140}Cl_2N_{26}O_{31}$・HCl）42%〕としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、0.13kPa以下の減圧下で、60℃、4時間乾燥した標準エンラマイシン1μgに相当する。

④　オキシテトラサイクリン

オキシテトラサイクリンの力価は、オキシテトラサイクリン（$C_{22}H_{24}N_2O_9$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準オキシテトラサイクリン1.082μgに相当する。

⑤　クロルテトラサイクリン

クロルテトラサイクリンの力価は、塩酸クロルテトラサイクリン（$C_{22}H_{23}ClN_2O_8$・HCl）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価)は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準クロルテトラサイクリン1μgに相当する。

⑥　コリスチン

コリスチンの力価は、コリスチンA（$C_{53}H_{100}N_{16}O_{13}$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準コリスチン1.21μgに相当する。(1μg（力価）は、30単位とする。)

⑦　サリノマイシン

サリノマイシンの力価は、サリノマイシンナトリウム（$C_{42}H_{69}O_{11}Na$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準サリノマイシン1μgに相当する。

⑧　セデカマイシン

セデカマイシンの力価は、セデカマイシンA（$C_{27}H_{35}NO_8$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準セデカマイシン1μgに相当する。

⑨　センデュラマイシン

センデュラマイシンの力価は、センデュラマイシンナトリウム（$C_{45}H_{75}O_{16}Na$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、0.67kPa以下の減圧下で、100℃、3時間乾燥した標準センデュラマイシン1μgに相当する。

⑩　タイロシン

タイロシンの力価は、タイロシンA（$C_{46}H_{77}NO_{17}$）としての量を重量（力価）で示す。1μg（力価）は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準タイロシン1μgに相当する。

⑪　ナラシン

ナラシンの力価は、ナラシンA（$C_{43}H_{72}O_{11}$）としての量を質量（力価）で示す。1μg(力価）は、標準ナラシン1μgに相当する。

⑫　ノシヘプタイド

ノシヘプタイドの力価は、ノシヘプタイド（$C_{51}H_{43}O_{12}N_{13}S_6$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準ノシヘプタイド1μgに相当する。

⑬　バシトラシン

バシトラシンの力価は、バシトラシンA（$C_{66}H_{103}N_{17}O_{16}S$）としての量を単位で示す。1単位は、0.67kPa以下の減圧下で、60℃、3時間乾燥した標準バシトラシン23.8μgに相当する。

⑭　バージニアマイシン

バージニアマイシンの力価は、バージニアマイシン〔バージニアマイシンM_1（$C_{28}H_{35}N_3O_7$）95%、バージニアマイシンS（$C_{43}H_{49}N_7O_{10}$）5%〕としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準バージニアマイシン1μgに相当する。

⑮　ビコザマイシン

ビコザマイシンの力価は、ビコザマイシン（$C_{12}H_{18}N_2O_7$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準ビコザマイシン1μgに相当する。

⑯　フラボフォスフォリポール

フラボフォスフォリポールの力価は、フラボフォスフォリポール（$C_{65\sim75}H_{124\sim135}N_{6\sim7}O_{40\sim42}P$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準フラボフォスフォリポール1μgに相当する。

⑰　モネンシン

モネンシンの力価は、モネンシンA（$C_{36}H_{62}O_{11}$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準モネンシン1.064μgに相当する。

⑱　ラサロシド

ラサロシドの力価は、ラサロシドナトリウム（$C_{34}H_{53}O_8Na$）としての量を質量（力価）で示す。1μg（力価）は、標準ラサロシド1μgに相当する。