石油エーテル　〔特級〕
石油ベンジン　〔特級〕
セデカマイシンC　$C_{25}H_{33}NO_7$　白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。
　含有比率　本品10mg（9.5～10.4mg）を量り、セデカマイシン製造用原体のセデカマイシンAの含有比率試験法を準用してセデカマイシンCの含有比率を求めるとき、90%以上である。
セデカマイシンD　$C_{27}H_{37}NO_8$　白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。
　含有比率　本品10mg（9.5～10.4mg）を量り、セデカマイシン製造用原体のセデカマイシンAの含有比率試験法を準用してセデカマイシンDの含有比率を求めるとき、90%以上である。
セデカマイシンF　$C_{25}H_{35}NO_7$　白色～淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である。
　含有比率　本品10mg（9.5～10.4mg）を量り、セデカマイシン製造用原体のセデカマイシンAの含有比率試験法を準用してセデカマイシンFの含有比率を求めるとき、90%以上である。
セルビオース　$C_{12}H_{22}O_{11}$
　比旋光度　$[\alpha]_D^{20}$＝＋34～＋35°
　重金属　10μg/g以下
　水分　0.5%以下
セルロース末、薄層クロマトグラフ用　セルロース末を薄層クロマトグラフ用に製造した上質のもの
セルロース末（蛍光剤入り）、薄層クロマトグラフ用　セルロース末、薄層クロマトグラフ用に蛍光剤を加えたもの
大豆ペプトン　淡黄色の粉末である。
　乾燥減量　５%以下（１g，85℃，１時間）
　溶解性　本品の溶液（１→100）を121℃で15分間高圧蒸気滅菌するとき､不溶物を認めない。
　pH　本品の溶液（１→100）を121℃で15分間高圧蒸気滅菌するときのpHは、7.0～7.5でなければならない。
多孔性スチレンジビニルベンゼン共重合体　多孔性スチレンジビニルベンゼン共重合体を液体クロマトグラフ用に製造した上質のものとする。
多孔性スチレンジビニルベンゼン共重合体精製樹脂　多孔性スチレンジビニルベンゼン共重合体を20倍量のメタノールに30分間浸漬し、攪拌した後、上澄液を捨て、順次20倍量の水、10倍量のアセトン、10倍量のメタノール・0.2mol/L塩酸試液混液（７：３）、20倍量の水及び20倍量のメタノール（１→２）で同様に処理し、メタノール（１→２）に浸漬して用いる。
脱脂綿　〔日局〕
タルトラトアンチモン(III)酸カリウム　$K(SbO)C_4H_4O_6 \cdot 1/2\,H_2O$　〔酒石酸アンチモニルカリウム、特級〕
タングステン酸ナトリウム　$Na_2WO_4 \cdot 2H_2O$〔特級〕
炭酸アンモニウム　〔特級〕
炭酸アンモニウム試液　炭酸アンモニウム20g（19.5～20.4g）及びアンモニア試液20mLに水を加えて溶かし、100mLとする。
炭酸カリウム　K_2CO_3〔炭酸カリウム（無水）、特級〕
炭酸水素ナトリウム　$NaHCO_3$〔炭酸水素ナトリウム（重炭酸ナリトウム）、特級〕
炭酸水素ナトリウム・水酸化ナトリウム緩衝液（pH9.0）　炭酸水素ナトリウム84.0g(83.95～84.04g）に水を加えて溶かし、900mLとする。この溶液に水酸化ナトリウム溶液（３→10）を加えてpHを9.0とし、水を加えて1,000mLとする。
炭酸水素ナトリウム、pH測定用　$NaHCO_3$〔炭酸水素ナトリウム（重炭酸ナトリウム）、pH測定用〕
炭酸水素ナトリウム・メタノール試液　炭酸水素ナトリウム0.25g（0.245～0.254g)にメタノール1,000mLを加えて溶かし、ろ過する。
炭酸ナトリウム　$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$〔特級〕
炭酸ナトリウム（標準試薬）　Na_2CO_3〔容量分析用標準試薬〕
炭酸ナトリウム、pH測定用　Na_2CO_3〔炭酸ナトリウム（無水）、pH測定用〕
炭酸ナトリウム、無水　Na_2CO_3〔炭酸ナトリウム（無水）、特級〕
炭酸ナトリウム試液　無水炭酸ナトリウム10.5g（10.45～10.54g）に水を加えて溶かし、100mLとする（１mol/L)。
炭酸ナトリウム試液、0.55mol/L　無水炭酸ナトリウム58.3g（58.25～58.34g）に水を加えて溶かし、1,000mLとする。
炭酸マグネシウム　〔日局〕
チオグリコール酸ナトリウム　$HSCH_2COONa$〔日局〕
チオシアン酸アンモニウム　NH_4SCN〔特級〕
チオシアン酸アンモニウム試液　チオシアン酸アンモニウム８g（7.5～8.4g）に水を加えて溶かし、100mLとする（１mol/L)。
チオシアン酸アンモニウム・硝酸コバルト試液　チオシアン酸アンモニウム17.4g（17.35～17.44g）及び硝酸コバルト2.8g（2.75～2.84g）を水に溶かし、100mLとする。
チオシアン酸カリウム　KSCN〔特級〕
チオシアン酸カリウム試液　チオシアン酸カリウム１g（0.5～1.4g）に水を加えて溶かし、10mLとする。
チオシアン酸水銀アンモニウム試液　チオシアン酸アンモニウム30g（29.5～30.4g）及び塩化第二水銀27g（26.5～27.4g）に水を加えて溶かし、1,000mLとする。
チオジエチレングリコール　$S(CH_2CH_2OH)_2$〔β-チオジグリコール、日局〕
チオ硫酸ナトリウム　$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$〔特級〕
窒素ガス　N_2〔窒素、日局〕
チモール　$CH_3C_6H_3(OH)CH(CH_3)_2$〔日局〕
チモールフタレイン　$C_{28}H_{30}O_4$〔特級〕　変色範囲pH（無色）9.3～10.5（青）
チモールフタレイン試液　チモールフタレイン0.1g（0.05～0.14g）にエタノール100mLを加えて溶かし、必要ならば、ろ過する。
チモールブルー　$C_{27}H_{30}O_5S$〔特級〕　変色範囲pH酸性側（赤）1.2～2.8（黄)、アルカリ性側（黄）8.0～9.6（青）
チモールブルー試液　チモールブルー0.1g（0.05～0.14g)にエタノール100mLを加えて溶かし、必要ならば、ろ過する。
チモールブルー・ジメチルホルムアミド試液　チモールブルー0.1g（0.05～0.14g）にジメチルホルムアミド100mLを加えて溶かす。
チモール・硫酸試液　チモール0.5g（0.45～0.54g）に硫酸５mLを加えて溶かし、エタノールを加えて100mLとする。
定量用エトキシキン　エトキシキン、定量用の項に定める。
定量用ギ酸ナトリウム　ギ酸ナトリウム、定量用の項に定める。
定量用酢酸*dl*-α-トコフェロール　酢酸*dl*-α-トコフェロール、定量用の項に定める。
定量用ニンヒドリン試液　ニンヒドリン試液、定量用の項に定める。
定量用*d*-ビオチン　*d*-ビオチン、定量用の項に定める。
定量用プロピオン酸ナトリウム　プロピオン酸ナトリウム、定量用の項に定める。
定量用DL-メチオニン　DL-メチオニン、定量用の項に定める。
定量用メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール　メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール、定量用の項に定める。
定量用メナジオン亜硫酸水素ナトリウム　メナジオン亜硫酸水素ナトリウム、定量用の項に定める。