| | |
|---|---|
| 芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体 | |
| アニシジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| アニリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| クロルジニトロベンゼン | 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| 四・四′―ジアミノジフェニルメタン | 皮膚障害又は肝障害 |
| ジニトロフェノール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、代謝亢進、肝障害又は腎障害 |
| ジニトロベンゼン | 溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 |
| ジメチルアニリン | 中枢神経系抑制、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| トリニトロトルエン（別名TNT） | 皮膚障害、溶血性貧血、再生不良性貧血等の造血器障害又は肝障害 |
| 二・四・六―トリニトロフェニルメチルニトロアミン（別名テトリル） | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 |
| トルイジン | 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| パラ―ニトロアニリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 |
| パラ―ニトロクロルベンゼン | 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| ニトロベンゼン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| パラ―フェニレンジアミン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 |
| フェネチジン | 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 |
| その他の芳香族化合物 | |
| クレゾール | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 |
| クロルヘキシジン | 皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応 |
| トリレンジイソシアネート（別名TDI） | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 |
| 一・五―ナフチレンジイソシアネート | 前眼部障害又は気道障害 |
| ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂 | 皮膚障害 |
| ヒドロキノン | 皮膚障害 |
| フェニルフェノール | 皮膚障害 |

| | |
|---|---|
| フェノール（別名石炭酸） | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 |
| オルト―フタロジニトリル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を伴う痙攣 |
| ベンゾトリクロライド | 皮膚障害又は気道障害 |
| 無水トリメリット酸 | 気道・肺障害又は溶血性貧血 |
| 無水フタル酸 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 |
| メチレンビスフェニルイソシアネート（別名MDI） | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 |
| 四―メトキシフェノール | 皮膚障害 |
| りん酸トリ―オルト―クレジル | 末梢神経障害 |
| レゾルシン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 |
| 複素環式化合物 | |
| 一・四―ジオキサン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害 |
| テトラヒドロフラン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は皮膚障害 |
| ピリジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 |
| ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を伴う痙攣 |
| 農薬その他の薬剤の有効成分 | |
| 有機りん化合物（ジチオリン酸O―エチル＝S・S―ジフェニル（別名EDDP）、ジチオリン酸O・O―ジエチル＝S―（二―エチルチオエチル）（別名エチルチオメトン）、チオリン酸O・O―ジエチル＝O―二―イソプロピル―四―メチル―六―ピリミジル（別名ダイアジノン）、チオリン酸O・O―ジメチル＝O―四―ニトロ―メタ―トリル（別名MEP）、チオリン酸S―ベンジル＝O・O―ジイソプロピル（別名IBP）、フェニルホスホノチオチオン酸O―エチル＝O―パラ―ニトロフェニル（別名EPN）、りん酸二・二―ジクロルビニル＝ジメチル（別名DDVP）及びりん酸パラ―メチルチオフェニル＝ジプロピルチオホスフェート（別名プロパホス）） | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害 |