105	生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	23.9	かつ	行動上の障害（A群）	≧	32.8	49.1%
	かつ 移乗	＝	0.0																					
106	生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≧	20.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7	62.5%
	かつ 移乗	＝	0.0	かつ	暴言暴行	≧	2.6																	
107	生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	32.8	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≧	20.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7	51.6%
	かつ 移乗	＝	0.0	かつ	暴言暴行	＝	0.0																	
108	生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	35.7	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	41.1	かつ	応用日常生活動作	≧	69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	72.7%
	かつ 行動上の障害（B群）	≦	26.4	かつ	移乗	≦	6.6	かつ	口腔清潔	≧	6.9													
109	生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	35.7	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	41.1	かつ	応用日常生活動作	≧	69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	56.6%
	かつ 行動上の障害（B群）	≦	26.4	かつ	移乗	≦	6.6	かつ	口腔清潔	＝	0.0													
110	排尿	＝	0.0	かつ	こだわり	＝	2.6	かつ	てんかん	≧	1.0													45.5%
111	排便	＝	0.0	かつ	こだわり	＝	2.6	かつ	てんかん	≧	1.0													44.0%
112	起居動作	≧	26.7	かつ	起居動作	≦	62.0	かつ	行動上の障害（B群）	＝	0.0	かつ	移動	＝	5.8	かつ	排便	＝	10.9					87.5%
113	起居動作	≧	26.7	かつ	起居動作	≦	62.0	かつ	行動上の障害（B群）	＝	0.0	かつ	排便	＝	10.9	かつ	麻痺　左下肢	≧	2.0					81.1%
114	起居動作	≧	26.7	かつ	起居動作	≦	62.0	かつ	行動上の障害（B群）	＝	0.0	かつ	排便	＝	10.9	かつ	麻痺　右下肢	≧	2.0					81.1%
115	起居動作	≧	26.7	かつ	起居動作	≦	62.0	かつ	行動上の障害（B群）	＝	0.0	かつ	排便	＝	10.9	かつ	関節の拘縮　その他	＝	0.0					80.4%
116	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	移乗	＝	6.6	かつ	薬の管理	＝	0.0	かつ	麻痺	＝	8.2					90.9%
117	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	移乗	＝	6.6	かつ	調理	＝	20.2	かつ	麻痺	＝	8.2					85.3%
118	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	認知機能	＝	0.0	かつ	移乗	＝	6.6	かつ	入浴	＝	6.1	かつ	関節の拘縮　肩関節　右	＝	0.0	87.1%
119	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	認知機能	＝	0.0	かつ	移乗	＝	6.6	かつ	入浴	＝	6.1	かつ	関節の拘縮　肩関節　左	＝	0.0	87.1%
120	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	寝返り	≧	7.8	かつ	寝返り	≦	10.4	かつ	移乗	＝	6.6	かつ	調理	＝	9.4	90.0%
121	起居動作	≦	6.8	かつ	生活機能Ⅰ	≦	4.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦	16.7	かつ	移乗	＝	6.6	75.0%
122	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	寝返り	≧	7.8	かつ	寝返り	≦	10.4	かつ	移乗	＝	6.6	かつ	片足での立位保持	≧	2.8	83.0%
	かつ 片足での立位保持	≦	3.4																					
123	生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	22.4	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	7.1	かつ	寝返り	≧	7.8	かつ	寝返り	≦	10.4	82.0%
	かつ 移乗	＝	6.6																					
124	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	認知機能	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.9	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	衣服の着脱	＝	12.0	100.0%
	かつ 感情が不安定	≧	2.1																					
125	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	認知機能	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.9	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	感情が不安定	≧	2.1	100.0%
	かつ 集団への不適応	≧	5.6																					
126	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	14.2	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	多飲水・過飲水	≧	4.4	66.7%
	かつ 麻痺	≦	2.9																					
127	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	14.2	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	落ち着きがない	≧	4.4	83.3%
	かつ 落ち着きがない	≦	5.0	かつ	麻痺	≦	2.9																	
128	生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	8.4	57.1%
	かつ 行動上の障害（C群）	≧	38.7	かつ	関節の拘縮　その他	＝	12.7																	
129	生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	8.4	62.5%
	かつ 行動上の障害（C群）	≧	38.7	かつ	移乗	＝	6.6																	
130	生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	35.7	かつ	生活機能Ⅱ	≧	41.2	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	53.8%
	かつ 行動上の障害（B群）	≦	26.4	かつ	移乗	＝	0.0																	
131	生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	8.4	100.0%
	かつ 行動上の障害（C群）	≧	38.7	かつ	落ち着きがない	≧	4.4	かつ	落ち着きがない	≦	5.0													