表大豆の項の次に次のように加える。

ウラルかんぞう	草丈、根の数、根の太さ、根の表皮の色、根の横断面の黄色系着色の強弱、茎の数、茎の太さ、節数、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の粗密、分枝の数、葉柄の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の波打ちの強弱、小葉の数、小葉の葉身の長さ、小葉の葉身の幅、小葉の葉身の長さ／幅、花序の数、花序の長さ、花序の幅、小花の数、小花の長さ、小花の幅、花の色、さやの幅、種子の粒数、萌芽の早晩性、開花の早晩性、枯れ上がりの早晩性、乾燥根の重量、グリチルリチン酸含量

表コンフレナ（せんにちこう）の項の次に次のように加える。

アジアわた	草姿、草丈、最下結果枝の着生位置、結果枝の長さ、結果枝の節数、結果枝の節間長、茎のアントシアニン着色の強弱、茎上部の毛の多少、葉の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉の裂片の深さ、葉の緑色の濃淡、葉の裏面の毛の多少、葉の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱、葉身の蜜腺の有無、花の着き方、花弁の色、花弁のスポットの有無、花粉の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭基部のアントシアニン着色の有無、果柄の長さ、さく果に対するほう葉の大きさ、ほう葉の鋸歯の細かさ、ほう葉のアントシアニン着色の有無、さく果の大きさ、さく果の縦断面の形、さく果の表面のくぼみの細かさ、さく果の先端の突出の強弱、さく果の開じょの強弱、百粒重、種子の地毛の色、種子の地毛の粗密、繰綿の実綿に対する重さの割合、繊維の色、繊維の長さ（繊維用品種に限る。）、繊維の長さの一様性（繊維用品種に限る。）、繊維の強さ（繊維用品種に限る。）、繊維の伸長率（繊維用品種に限る。）、繊維の細かさ（繊維用品種に限る。）、開花始期、さく果の開じょ期

表ホヤくう（つぼさんご）の項を次のように改める。

ホイヘラ（つぼさんご）	草丈、株幅、葉の粗密、若葉の葉身の色、若葉の葉身の色の分布、若葉の葉身の色の模様、若葉の葉身の色の面積、葉柄の長さ、葉柄の毛の粗密、葉柄の主な色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の先端部の形、葉身裂片の切れ込みの深さ、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）、葉身の周縁部の欠刻の数、葉身の周縁部の欠刻の深さ、葉身の周縁部の波打ちの強弱、葉身のしわ、葉身の光沢、葉身の毛の粗密、葉身の裏面の毛の粗密、葉身の色、葉身の色の分布、葉身の色の模様、葉身の色の面積、葉身の裏面の色、花茎の向き、花茎の長さ、花茎の主な色、花茎の花の着生する部位の長さ、花茎の花の着生する部位の幅、花茎の花の着生する部位の長さ／幅、花茎の花の粗密、つぼみの色、花の向き、花の長さ、花の幅、花の外面の色、花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）

表大麦の項中「護穎」を「護穎」に改め、同表ニューギニアインパチェンスの項中「株の幅」を「株幅」に改め、「（斑入り品種に限る。）」及び「（裏面の色が赤の品種に限る。）」を削り、「長さ（一重品種に限る。）」の次に「、花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）、距の曲がりの強弱」を加え、同表カルミアの項の次に次のように加える。

クニフォフィア	草丈、葉の展開状態、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の表面の色、葉の横断面の形、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花序の葉に対する位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花序の花の粗密、未熟なつぼみの主な色、開花直前のつぼみの主な色、花被の色の変化の有無、花被の向き、花被の長さ、花被の筒部の直径、花被の長さ／花被の筒部の直径、花被の筒部の外面の色、花被の裂片の湾曲、花糸の色、花被の長さに対する雄ずいの長さ

表ラベンダーの項中「ラベンダー」を「ラウァンドゥラ（ラベンダー）」に、「葉の周縁の切れ込みの有無」を「葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の切れ込み、葉の斑の有無、葉の斑の分布、葉の斑の色」に、「Pterostechas 節」を「Pterostoechas 節」に、「ほう葉の有無（」を「小ほう葉の有無（」に改め、「がくの毛の粗密」の次に「、花冠の色数」を「花冠の主な色」の次に「、花冠の二次色、花冠の二次色の分布」を加え、同表リモニウム（ヨスターチス）の項中「、分けつの多少」を削り、「花柄」を「花茎」に、「中ろく」を「中肋」に改め、同表ロブリアの項の次に次のように加える。

ロブラリア	草丈、株幅、茎の分枝の粗密、茎の基部の太さ、茎の色、茎の毛の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の周縁の形、葉の先端の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の有無、花序の直径、花序の小花数、小花の直径、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花柄のアントシアニン着色の有無、がく片の形、がく片の緑色の濃淡、がく片のアントシアニン着色の有無、がく片の毛の有無、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、開花初期の花弁の色、開花盛期の花弁の色

表もくれんの項の次に次のように加える。

マルコミア　マリティマ	草姿、草丈、株幅、分枝の粗密、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の多少、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉表面の緑色の濃淡、葉身の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉身の長さ、葉身の幅、がくの色、花の直径、花の目の有無、花弁の形、花弁先端の切れ込みの深さ、花弁表面の主な色、花弁表面の二次色、開花後期の花弁表面の主な色、開花後期の花弁表面の脈の明瞭度

表桑の項を次のように改める。

桑	倍数性、樹勢、刈桑樹型、冬芽の形、冬芽の大小、冬芽の色、副芽の多少、枝条数、枝の揃い、側枝数、矮小枝条の数、枝条の長さ、枝条の太さ、枝条の色、枝の屈曲の強弱、節間長、葉序、葉の着生角度、葉身の欠刻の数、葉身の欠刻の深さ、葉身の大きさ、葉身の先端の形、葉身の鋸歯の形、葉身の基部の形、葉身の表面の色、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の厚さ、葉柄の長さ、花性、雌花穂の多少、花柱の長さ、果実の縦径（果実用品種に限る。）、果実の横径（果実用品種に限る。）、果実の形（果実用品種に限る。）、果実の重さ（果実用品種に限る。）、果実の色（果実用品種に限る。）、着果数、果柄の長さ（果実用品種に限る。）、種子の大きさ（果実用品種に限る。）、発芽の早晩、再発芽力、枝条の伸長停止期、さし木の発根力、枝条の先枯れの多少、耐倒伏性、胴枯病抵抗性、縮葉細菌病抵抗性、萎縮病抵抗性、裏うどんこ病抵抗性、菌核病抵抗性（果実用品種に限る。）、春蚕期の収葉量（果実用品種を除く。）、夏秋蚕期の収葉量（果実用品種を除く。）、春蚕期の新しょう割合（果実用品種を除く。）、夏秋蚕期の葉量割合（果実用品種を除く。）、芽のすそ上り、葉のこき取りの難易、葉の硬化の早晩、飼料価値（蚕飼料用品種に限る。）、開花期（果実用品種に限る。）、成熟期（果実用品種に限る。）、糖度（果実用品種に限る。）、酸度（果実用品種に限る。）

表はすの項の次に次のように加える。

ふうらん	一　草型及び草丈 二　茎又はぎ球茎の形、茎の太さ、ぎ球茎の大きさ、茎又はぎ球茎の色、茎の毛の多少、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三　花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花茎の抽出角度、花茎の分枝性、花芽の発生位置及び花の香り 四　開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性