第1のAの6の(1)の表のアメトクトラジンの項の次に次のように加える。

| | | |
|---|---|---|
| アメトクトラジン | ばれいしょ | 0.05ppm |
| | さといも類 | 0.05ppm |
| | かんしょ | 0.05ppm |
| | やまいも | 0.05ppm |
| | その他のいも類 | 0.05ppm |
| | だいこん類の葉 | 50ppm |
| | かぶ類の葉 | 50ppm |
| | クレソン | 50ppm |
| | はくさい | 50ppm |
| | キャベツ | 9 ppm |
| | 芽キャベツ | 9 ppm |
| | ケール | 50ppm |
| | こまつな | 50ppm |
| | きょうな | 50ppm |
| | チンゲンサイ | 50ppm |
| | カリフラワー | 9 ppm |
| | ブロッコリー | 9 ppm |
| | その他のあぶらな科野菜 | 50ppm |
| | チコリ | 50ppm |
| | エンダイブ | 50ppm |
| | しゅんぎく | 50ppm |
| | レタス | 50ppm |
| | その他のきく科野菜 | 50ppm |
| | たまねぎ | 2 ppm |
| | ねぎ | 20ppm |
| | にんにく | 2 ppm |
| | にら | 20ppm |
| | その他のゆり科野菜 | 20ppm |
| | パセリ | 40ppm |
| | セロリ | 40ppm |
| | その他のせり科野菜 | 40ppm |
| | トマト | 5 ppm |
| | ピーマン | 2 ppm |
| | なす | 2 ppm |
| | その他のなす科野菜 | 50ppm |
| | きゅうり | 3 ppm |
| | かぼちゃ | 3 ppm |
| | しろうり | 3 ppm |
| | その他のうり科野菜 | 50ppm |
| | ほうれんそう | 50ppm |
| | オクラ | 2 ppm |
| | しょうが | 0.05ppm |
| | しいたけ | 2 ppm |
| | その他のきのこ類 | 2 ppm |
| | その他の野菜 | 50ppm |
| | ぶどう | 25ppm |
| | その他の果実 | 2 ppm |
| | ホップ | 30ppm |
| | その他のスパイス（根又は根茎に限る。） | 0.05ppm |
| | その他のハーブ | 40ppm |
| | 鶏の筋肉 | 0.03ppm |
| | その他の家きんの筋肉 | 0.03ppm |
| | 鶏の脂肪 | 0.03ppm |
| | その他の家きんの脂肪 | 0.03ppm |
| | 鶏の肝臓 | 0.03ppm |
| | その他の家きんの肝臓 | 0.03ppm |
| | 鶏の腎臓 | 0.03ppm |
| | その他の家きんの腎臓 | 0.03ppm |
| | 鶏の食用部分 | 0.03ppm |
| | その他の家きんの食用部分 | 0.03ppm |
| | 鶏の卵 | 0.03ppm |
| | その他の家きんの卵 | 0.03ppm |
| | とうがらし（乾燥させたもの） | 15ppm |
| | 干しぶどう | 85ppm |

第1のAの6の(1)の表のイソプロチオランの項を次のように改める。

| | | |
|---|---|---|
| イソプロチオラン | 米 | 10ppm |
| | りんご | 0.05ppm |
| | 日本なし | 0.05ppm |
| | 西洋なし | 0.05ppm |
| | びわ | 0.02ppm |
| | もも | 0.02ppm |
| | うめ | 0.03ppm |
| | おうとう | 0.05ppm |
| | ぶどう | 0.02ppm |
| | 牛の筋肉 | 0.02ppm |
| | 牛の脂肪 | 0.02ppm |
| | 牛の肝臓 | 0.02ppm |
| | 牛の腎臓 | 0.02ppm |
| | 牛の食用部分 | 0.02ppm |
| | 乳 | 0.02ppm |
| | 魚介類 | 3 ppm |