表オドントグロッサムの項を削り、同表ゆりとうわたの項の次に次のように加える。

オゾタムヌス　ディオスミフォリウス	樹姿、樹高、樹幅、枝の太さ、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、花序の数、花序の高さ、花序の幅、一花序当たりの花の数、つぼみの色、花の長さ、花の幅、総ほうの色、柱頭の色、開花始期

表ゼラニウムの項の次に次のように加える。

ペンニセツム　セタケウム	草型、葉群の高さ、株幅、分げつ数、稈の長さ、葉の数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の模様、葉身の表面の斑の色、葉身の表面のアントシアニン着色の有無、葉身の表面のアントシアニン着色の面積、葉身の表面のアントシアニン着色部の主な色、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色の有無、葉身の裏面の二次色、穂の長さ、穂の幅、穂のアントシアニン着色の有無、穂のアントシアニン着色の面積、小穂の着生の粗密、花柱の色、出穂期

表ペラルゴニウムの項の次に次のように加える。

ペペロミア	草型、草丈、株幅、葉の数（ロゼット型の品種に限る。）、茎の長さ（ロゼット型の品種を除く。）、茎の太さ（ロゼット型の品種を除く。）、節数（ロゼット型の品種を除く。）、節間長（ロゼット型の品種を除く。）、茎の緑色の濃淡（ロゼット型の品種を除く。）、茎のアントシアニン着色の有無（ロゼット型の品種を除く。）、茎のアントシアニン着色の面積（ロゼット型の品種を除く。）、葉序（ロゼット型の品種を除く。）、葉の着き方、葉の向き（ロゼット型の品種に限る。）、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の横断面の形、葉身の表面の光沢、葉身の表面の凹凸、葉身の毛の多少、新葉の表面の主な色、新葉の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、新葉の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、成葉の表面の色数、成葉の表面の主な色、成葉の表面の二次色（２色以上の品種に限る。）、成葉の表面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、成葉の表面の三次色（３色以上の品種に限る。）、成葉の表面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、成葉の裏面の色数、成葉の裏面の主な色、成葉の裏面の二次色（２色以上の品種に限る。）、成葉の裏面の二次色の分布（２色以上の品種に限る。）、葉柄の長さ、葉柄の毛の多少、葉柄の色
ひめつるそば	草丈、茎の長さ、茎の太さ、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の波打ち、葉の表面の主な色、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の主な模様、葉の表面の斑の色数、葉の表面の斑の主な色、葉の表面の斑の二次色（２色以上の品種に限る。）、葉の表面の斑の三次色（３色以上の品種に限る。）、葉の表面の帯状紋の明瞭度、葉の裏面のアントシアニンの着色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、頭状花序の長さ、頭状花序の幅、頭状花序の主な色

表プリムラ（在来さくらそうを除く。）の項を次のように改める。

プリムラ（在来さくらそうを除く。）	草丈、花序の数、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の長さ／葉柄の長さ、葉身の最大幅の位置、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無、葉身の切れ込みの深さ、葉身の切れ込みの粗密、葉身の周縁の波打ち、葉身の表面の毛の多少、葉身の裏面の白粉、花序の型、花序の段差の明瞭度、花の向き、花柄の抽出、花柄の長さ、花柄のアントシアニンの着色、花柄の毛の多少、がくの長さ、がくの幅、がくの白粉、花型、花の大きさ、花冠裂片の数、花冠裂片の向き、花冠裂片の重なり（一重品種に限る。）、花冠裂片の主な色、花冠裂片の裏面の主な色、花色の移行性、花冠の目の有無、花冠の目の大きさ（一重品種に限る。）、花冠の目の色、花冠の蛇の目の有無、花冠の蛇の目の色、花冠の覆輪の有無、花冠の覆輪の大きさ、花冠の覆輪の色、花冠の縞斑の有無、花冠の縞斑の色、花冠裂片の切れ込み、花冠裂片の波打ち、花の香り、開花始期

表わびすの項の次に次のように加える。

センペルウィウム	草丈、株幅、葉の数、株中心部の葉の粗密、外葉の長さ、外葉の幅、外葉の厚さ、外葉の厚さ／幅、外葉の形、外葉の先端部の形、外葉の縦断面の形、中間葉の表面の複色の有無、中間葉の表面の主な色、中間葉の表面の二次色、中間葉の表面の二次色の分布、中間葉の表面の二次色の面積、中間葉の表面の三次色（３色以上の品種に限る。）、中間葉の表面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、中間葉の表面の三次色の面積（３色以上の品種に限る。）、中間葉の裏面の複色の有無、中間葉の裏面の主な色、中間葉の裏面の二次色、中間葉の裏面の二次色の分布、中間葉の裏面の二次色の面積、中間葉の裏面の三次色（３色以上の品種に限る。）、中間葉の裏面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、中間葉の裏面の三次色の面積（３色以上の品種に限る。）、外葉の表面の複色の有無、外葉の表面の主な色、外葉の表面の二次色、外葉の表面の二次色の分布、外葉の表面の二次色の面積、外葉の表面の三次色（３色以上の品種に限る。）、外葉の表面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、外葉の表面の三次色の面積（３色以上の品種に限る。）、外葉の裏面の複色の有無、外葉の裏面の主な色、外葉の裏面の二次色、外葉の裏面の二次色の分布、外葉の裏面の二次色の面積、外葉の裏面の三次色（３色以上の品種に限る。）、外葉の裏面の三次色の分布（３色以上の品種に限る。）、外葉の裏面の三次色の面積（３色以上の品種に限る。）、親株と比較した子株の葉の色の類似性、中間葉の表面の毛の粗密、中間葉の裏面の毛の粗密、中間葉の葉縁の毛の長さ、中間葉の頂端の毛の長さ

表あわの項を次のように改める。

あわ	第一葉の先端の形、葉しょうのアントシアニンの着色、葉群の緑色の濃淡、草姿、葉の襟のアントシアニンの着色、出穂期、支持根のアントシアニン着色の有無、葉身の姿勢、穂の硬毛の長さ、穂の硬毛のアントシアニン着色の有無、やくの色、止め葉の長さ、止め葉の幅、止め葉のアントシアニンの着色、稈の長さ、稈の直径、護穎のアントシアニン着色の有無、節間の数、穂の姿勢、穂首の長さ、穂の形、穂の長さ、枝梗の粗密（猿手状の穂を持つ品種を除く。）、一次枝梗の着生粒数、穀粒の千粒重、穀粒の形、穀粒の色、玄穀粒の色（無精白）、胚乳の型

表なす（ナス、ピーマン、ふゆさんご及びばれいしょを除く。）の項中「ペピーノ」の次に「、ソラヌム　ペルウィアヌム」を加え、同表ピーマンの項の次に次のように加える。

ソラヌム　ペルウィアヌム	胚軸のアントシアニン着色の有無、草姿、心止まり性（心止まり品種に限る。）、茎のアントシアニンの着色、節間長（普通品種に限る。）、葉の着生角度、葉の長さ、葉の幅、葉の欠刻、葉の上面の膨らみの強弱、小葉の大きさ、小葉の緑色の濃淡、小葉の着生角度、花房の型、花の帯化の有無、花の色、果柄の離層の有無、果柄の長さ（果柄に離層がある品種に限る。）、果実の大きさ、果実の縦径／横径、果実の縦断面の形、果実の肩部のひだ、果実の横断面の形、果実のこうあ部のくぼみ、果実のへた落ちの大きさ、果実の花落ちの大きさ、果実の頂部の形、果実の緑色の濃淡、果実の色、果実のアントシアニン着色の有無、果肉の厚さ、果実の子室数、果肉の色、果実の心の大きさ、果実の硬さ、棚持ちの良さ（生食用品種に限る。）、開花の早晩、完熟の早晩