d　測定条件

カラム：オクタデシルシリル化シリカゲル　内径2.1㎜，長さ150㎜，粒子径３μm

カラム温度：40℃

移動相：アセトニトリル及び0.1vol％酢酸（１：19）から（１：１）までの濃度勾配を15分間で行う。

イオン化モード：エレクトロスプレーイオン化法　ポジティブイオンモード

主なイオン（m／z）：

３－メチルキノキサリン－２－カルボン酸　プリカーサーイオン　189，プロダクトイオン　145，143

キノキサリン－２－カルボン酸　プリカーサーイオン　175，プロダクトイオン　129，102

注入量：５μl

保持時間の目安：

３－メチルキノキサリン－２－カルボン酸　11分

キノキサリン－２－カルボン酸　11分

第１のＡの６中「(9)まで」を「(10)まで」に改め、同６の(1)の表のエチプロールの項を次のように改める。

エチプロール	米	0.2ppm
	大豆	0.2ppm
	えだまめ	0.5ppm
	みかん	0.1ppm
	なつみかんの果実全体	0.7ppm
	レモン	0.7ppm
	オレンジ	0.7ppm
	グレープフルーツ	0.7ppm
	ライム	0.7ppm
	その他のかんきつ類果実	0.7ppm
	りんご	1 ppm
	かき	0.2ppm
	マンゴー	0.5ppm
	茶	10ppm
	その他のスパイス	3 ppm
	魚介類	0.09ppm

第１のＡの６の(1)の表のエトキシスルフロンの項の次に次のように加える。

エトキシスルフロン	米	0.02ppm
	さとうきび	0.01ppm

第１のＡの６の(1)の表のエトベンザニドの項を次のように改める。

エトベンザニド	米	0.1ppm
	魚介類	0.02ppm

第１のＡの６の(1)の表のエポキシコナゾールの項の次に次のように加える。

エポキシコナゾール	小麦	0.2ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	0.2ppm
	その他の穀類	1 ppm
	大豆	0.05ppm
	らっかせい	0.05ppm
	さとうきび	0.03ppm
	バナナ	0.5ppm
	コーヒー豆	0.05ppm
	牛の筋肉	0.01ppm
	豚の筋肉	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
	牛の脂肪	0.01ppm
	豚の脂肪	0.01ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
	牛の肝臓	0.2ppm
	豚の肝臓	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.2ppm
	牛の腎臓	0.02ppm
	豚の腎臓	0.02ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.02ppm
	牛の食用部分	0.2ppm
	豚の食用部分	0.2ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.2ppm
	乳	0.002ppm
	鶏の筋肉	0.01ppm
	その他の家きんの筋肉	0.01ppm
	鶏の脂肪	0.01ppm
	その他の家きんの脂肪	0.01ppm
	鶏の肝臓	0.01ppm
	その他の家きんの肝臓	0.01ppm
	鶏の腎臓	0.01ppm
	その他の家きんの腎臓	0.01ppm
	鶏の食用部分	0.01ppm
	その他の家きんの食用部分	0.01ppm
	鶏の卵	0.01ppm
	その他の家きんの卵	0.01ppm

第１のＡの６の(1)の表のオキシテトラサイクリンの項を次のように改める。

オキシテトラサイクリン	ばれいしょ	0.2ppm
	こんにゃくいも	0.2ppm
	だいこん類の根	0.2ppm
	だいこん類の葉	0.2ppm