| | | |
|---|---|---|
| | 牛の腎臓 | 0.01ppm |
| | 豚の腎臓 | 0.01ppm |
| | その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.01ppm |
| | 牛の食用部分 | 0.01ppm |
| | 豚の食用部分 | 0.01ppm |
| | その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.01ppm |
| | 乳 | 0.01ppm |
| | 鶏の筋肉 | 0.01ppm |
| | その他の家きんの筋肉 | 0.01ppm |
| | 鶏の脂肪 | 0.01ppm |
| | その他の家きんの脂肪 | 0.01ppm |
| | 鶏の肝臓 | 0.01ppm |
| | その他の家きんの肝臓 | 0.01ppm |
| | 鶏の腎臓 | 0.01ppm |
| | その他の家きんの腎臓 | 0.01ppm |
| | 鶏の食用部分 | 0.01ppm |
| | その他の家きんの食用部分 | 0.01ppm |
| | 鶏の卵 | 0.01ppm |
| | その他の家きんの卵 | 0.01ppm |

第一のAの6の(1)の表のプロピコナゾールの項の次に次のように加える。

| | | |
|---|---|---|
| プロピザミド | キャベツ | 0.05ppm |
| | ブロッコリー | 0.05ppm |
| | ごぼう | 0.02ppm |
| | チコリ | 0.05ppm |
| | エンダイブ | 1 ppm |
| | しゅんぎく | 0.3ppm |
| | レタス | 1 ppm |
| | その他のきく科野菜 | 0.05ppm |
| | たまねぎ | 0.05ppm |

第一のAの6の(1)の表のベンチアバリカルブイソプロピルの項を次のように改める。

| | | |
|---|---|---|
| ベンチアバリカルブイソプロピル | 大豆 | 0.05ppm |
| | ばれいしょ | 0.02ppm |
| | はくさい | 2 ppm |
| | キャベツ | 0.05ppm |
| | ブロッコリー | 1 ppm |
| | たまねぎ | 0.02ppm |
| | ねぎ | 0.7ppm |
| | アスパラガス | 0.3ppm |
| | その他のゆり科野菜 | 0.05ppm |
| | トマト | 2 ppm |
| | なす | 2 ppm |
| | その他のなす科野菜 | 2 ppm |
| | きゅうり | 0.5ppm |
| | かぼちゃ | 0.3ppm |
| | すいか | 0.05ppm |
| | メロン類果実 | 0.05ppm |
| | いちご | 2 ppm |
| | ぶどう | 2 ppm |
| | その他の果実 | 1 ppm |

第一のAの6の(1)の表のベンチオピラドの項を次のように改める。

| | | |
|---|---|---|
| ベンチオピラド | 小麦 | 0.2ppm |
| | 大麦 | 0.2ppm |
| | ライ麦 | 0.2ppm |
| | とうもろこし | 0.02ppm |
| | そば | 0.2ppm |
| | その他の穀類 | 0.8ppm |
| | 大豆 | 0.4ppm |
| | 小豆類 | 0.4ppm |
| | えんどう | 0.4ppm |
| | そら豆 | 0.4ppm |
| | らっかせい | 0.05ppm |
| | その他の豆類 | 0.4ppm |
| | ばれいしょ | 0.06ppm |
| | さといも類 | 0.06ppm |
| | かんしょ | 0.06ppm |
| | やまいも | 0.06ppm |
| | その他のいも類 | 0.06ppm |
| | てんさい | 0.5ppm |
| | だいこん類の葉 | 30ppm |
| | かぶ類の葉 | 50ppm |
| | クレソン | 30ppm |
| | はくさい | 30ppm |
| | キャベツ | 5 ppm |
| | 芽キャベツ | 5 ppm |
| | ケール | 50ppm |
| | こまつな | 50ppm |
| | きょうな | 50ppm |
| | チンゲンサイ | 50ppm |
| | カリフラワー | 5 ppm |
| | ブロッコリー | 10ppm |