| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ぶどう | 小粒系 | 1,800 | 298 | 露地栽培 |
| | | 1,800 | 322 | 無加温施設栽培 |
| | 大粒系 | 1,500 | 271 | 露地栽培 |
| | | 1,500 | 371 | 無加温施設栽培 |
| | | 1,500 | 397 | 加温施設栽培 |
| なし | 青なし | 4,500 | 296 | 自家和合性品種 |
| | 赤なし | 3,000 | 192 | 樹体ジョイント仕立て |
| | 西洋なし | 3,200 | 209 | |
| もも | | 2,300 | 412 | 低樹高仕立て |
| おうとう | | 700 | 480 | 雨よけ施設栽培 |
| びわ | | 1,100 | 290 | |
| かき | | 2,500 | 83 | 樹体ジョイント仕立て |
| くり | | 350 | 48 | 低樹高仕立て |
| うめ | | 2,000 | 118 | |
| すもも | | 2,000 | 191 | |
| キウイフルーツ | | 2,500 | 192 | 溶液受粉 |
| パインアップル | | 4,000 | 35 | 露地栽培（４年２収） |
| | | 4,000 | 105 | 無加温施設栽培（４年２収） |

㈱１．りんごはふじ、ぶどうのうち小粒系はデラウェア（ジベレリン処理）、大粒系は巨峰、なしのうち青なしはおさゴールド、赤なしは幸水、ももは白鳳、おうとうは佐藤錦、かきは富有によるものとする。

２．10ａ当たり生産量及び労働時間は成園に係るものである。

３．主幹樹形栽培とは、主幹から側枝を伸ばして樹巾1.2～1.4m、樹高2.2m程度の円筒形に仕立てた樹形にすることで、早期成園化や、傾斜地においても機械化による省力化が可能となる技術。

２　果樹園経営の指標

| | | かんきつ | | | りんご | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 関東以西 | | | 関東以北 | | |
| 基幹技術・経営方針等 | | 主幹樹形栽培<br>摘果剤<br>アシストスーツ<br>わい性台木（ヒリュウ台）<br>わい性台木（ヒリュウ台） | マルチドリップかんがい方式<br>フィールドサーバーの導入<br>アシストスーツ<br>高品質生産による産地ブランド化<br>わい性台木（ヒリュウ台） | 中晩かんの多品目生産<br>マルチシートの利用<br>作期分散・販売期間拡大<br>地域オリジナル品種の導入 | 新わい化栽培（高密植栽培）<br>作期分散<br>規模拡大 | 加工専用園<br>アシストスーツ<br>規模拡大<br>契約栽培 | 複合経営<br>アシストスーツ |
| | 単位 | | | | | | |
| 経営規模 | ha | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 15.0 | 2.1 |
| 作付面積 | ha | うんしゅうみかん<br>極早生 1.0<br>早生 1.6<br>普通 1.4 | うんしゅうみかん<br>極早生 1.0<br>早生 1.4<br>普通 1.1 | うんしゅうみかん<br>早生 0.3<br>宮内いよかん 1.2<br>甘平 0.6<br>カラ 0.5<br>愛媛果試第28号（紅まどんな）（施設） 0.3<br>しらぬひ（雨よけ） 0.3<br>せとか 0.3 | りんご<br>早生（つがる） 0.5<br>中生（シナノスイート） 0.8<br>晩生（ふじ） 1.5 | りんご<br>早生（つがる） 2.6<br>中生（紅玉） 10.0<br>晩生（ふじ） 2.4 | りんご<br>早生（つがる） 0.7<br>中生（紅玉） 1.0<br>おうとう<br>紅秀峰 0.1<br>佐藤錦 0.2<br>紅きらり 0.1 |