7149　{アダマンタン－１－アミンとシクロマルトヘキサオースと［α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）の末端カルボン酸化物］の反応生成物}と２－メチルオキシランの反応生成物（ロタキサン構造に限る。）（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3351

7150　シクロヘキシル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3410

7151　ポリ［シクロペンタン－１，３－ジイルエチレン／８（又は９）－（メトキシカルボニル）－８（又は９）－メチルトリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカン－３，５－ジイルエチレン／テトラシクロ［５．５．１．$0^{2,6}$．$0^{8,12}$］トリデカン－３，５－ジイルエチレン］（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3411

7152　アクリル酸エチル・アクリル酸ブチル・アクリロニトリル・メタクリル酸＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸＝２－ヒドロキシエチル共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のメタクリル酸＝２，３－エポキシプロピルの含有率が10重量％以下であるものに限る。）　(6)－3412

7153　３，３′－ジアミノ－*N*，*N*′－［(１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル)ビス(６－ヒドロキシ－３，１－フェニレン)］ジベンズアミド・３，３′－［オキシビス（ジメチルシランジイル)］ジプロパン－１－アミン・２，２′－ジアミノ－４，４′－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・１，１′－ジメチル＝二水素＝４，４′－オキシジフタラート・１，１′－ジメチル＝二水素＝４，４′－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフタラート重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3352

7154　アクリルアミド・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－ビニルベンゼンスルホナート・ナトリウム＝２－メチルプロパー２－エン－１－スルホナート・２－メチリデンコハク酸共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3413

7155　２－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・無水マレイン酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3414

7156　２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3415

7157　アクリル酸・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3416

7158　オクタデシル＝アクリラート・クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・*N*－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3417

7159　クロロエテン・ドコシル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・ビス（２－エチルヘキシル）＝マレアート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3418

7160　アジピン酸・11－アミノウンデカン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3353

7161　11－アミノウンデカン酸・２，２′－ジメチル－４，４′－メチレンジシクロヘキサン－１－アミン・デカン二酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3354

7162　メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・２－（２－メトキシエトキシ）エチル＝メタクリラート共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート完全付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3419

7163　２，２′－ジメチル－４，４′－（９*H*－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール・４，４′－(デカン－１，１－ジイル)ジフェノール・ホスゲン重縮合物の両末端４－*tert*－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3355

7164　（*Z*）－３，４－ジヒドロキシ－１－（オクタデカ－９－エン－１－イル）ピロリジン－２，５－ジオンを主成分（60％以上）とする、酒石酸とモノ（又はジ)［アルキル（又はアルケニル)（Ｃ＝14～24、直鎖型)］アミンの反応生成物　(5)－6987

7165　N^2－ドデカノイル－Ｌ－アルギニン　(2)－4145

7166　{プロパン－１，２，３－トリイル＝トリス［アルカノアート（又はアルケノアート)］}(大豆油由来）のエポキシ化物とメタノールの反応生成物（数平均分子量が1,700以下であるものに限る。）　(7)－3356

7167　ペンタン－１，５－ジアミン　(2)－4146

7168　３，６－ビス（４－ブロモフェニル)－２，５－ジヒドロピロロ［３，４－*c*］ピロール－１，４－ジオン　(5)－6988

7169　［２－({３－（アクリロイルオキシ）－２－［(アクリロイルオキシ)メチル］－２－（ヒドロキシメチル）プロポキシ}メチル)－２－［(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン－１，３－ジイル＝ジアクリラートと２，４－ジイソシアナトトルエンと｛２，２′－ビス（ヒドロキシメチル）－２，２′－［４，４，８，８，12，12，16，16－オクタキス（ヒドロキシメチル）－２，６，10，14，18－ペンタオキサノナデカン－１，19－ジイル］ジプロパン－１，３－ジオールとアクリル酸のエステル化反応生成物（トリデカエステル化物に限る。)｝と{２，２′－ビス（ヒドロキシメチル）－２，２′－［４，４，８，８－テトラキス(ヒドロキシメチル)－２，６，10－トリオキサウンデカン－１，11－ジイル］ジプロパン－１，３－ジオールとアクリル酸のエステル化反応生成物（ノナエステル化物に限る。)｝の反応生成物（分子量が1,200～3,100のものに限る。)］のスルファニル酢酸付加物　(3)－4647

7170　シクロヘキサン－*r*－１，*c*－２，*c*－４－トリカルボン酸＝１，２－無水物とシクロヘキサン－*r*－１，*t*－２，*t*－４－トリカルボン酸＝１，２－無水物の混合物　(5)－6989

7171　（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝メタクリラート・スチレン・［３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・トリメトキシ（メチル）シラン重縮合物］・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中の（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝メタクリラートの含有率が70重量％以下であるものに限る。）　(7)－3357