表ねむのきの項の次に次のように加える。

アルブカ　スピリリス	葉群の高さ、葉群の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の縦断面の形、葉の横断面の形、葉の色、花柄の長さ、花柄の直径、花柄の色、花序の長さ、花序の幅、花の数、小花柄の向き、小花柄の長さ、小花柄の直径、小花柄の色、花の高さ、花の幅、外花被片の長さ、外花被片の幅、外花被片の形、外花被片の縦断面の形、外花被片の横断面の形、外花被片の先端の形、外花被片の内面の周縁部の主な色、外花被片の内面の中央部の主な色、外花被片の外面の周縁部の主な色、外花被片の外面の中央部の主な色、内花被片の形、内花被片の先端の形、内花被片の内面の周縁部の主な色、内花被片の内面の中央部の主な色、内花被片の外面の周縁部の主な色、内花被片の外面の中央部の主な色

表アフェランドラ　スクアロサの項の次に次のように加える。

アメリカホドイモ	茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニンの着色、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、頂小葉の形、頂小葉の先端の形、頂小葉の基部の形、花序の長さ、花序の幅、花弁の色、塊茎の形、塊茎の皮色の褐色の濃淡、塊茎の表皮の粗滑、塊茎の肉色、上いも数、上いもの平均重、開花始期、収穫期

表アスター（旧しおん）の項中「アスター（旧しおん）」の次に「（ミヤマヨメナ（旧ミヤコワスレ）を除く。）」を加え、同項の次に次のように加える。

ミヤマヨメナ（旧ミヤコワスレ）	一　草姿及び草丈 二　茎の形状及び葉の形状 三　花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四　品質特性 五　早晩性、稔性（不稔現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六　前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあっては根の形状、主に食用のデンプン源、タンパク源等として使用するものにあっては収量性、台木用品種にあっては接ぎ木特性

表アスティルベの項を次のように改める。

アスティルベ	草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、茎の屈曲、節間長、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉の光沢、葉の斑の有無、葉の毛の多少、小葉の形、小葉の先端の形、小葉の縁の鋸歯、葉柄の長さ、葉柄の色、花穂の長さ、花穂の幅、花穂の形、花穂の曲がり、花穂の小花穂の着生密度、小花穂の形、小花穂の曲がり、花の大きさ、がくの色、花弁の数、花弁の形、花弁の色、やくの色、雌ずいの色、花の香り、開花期

表くろばなろうばいの項を次のように改める。

くろばなろうばい	樹姿、樹高、側枝の粗密、当年枝の長さ、当年枝の節の数、前年枝の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の鋸歯の有無、葉身の表面の毛の粗密、葉身の裏面の毛の粗密、葉柄の長さ、花柄の長さ、花の大きさ、花形、花被片の数、外花被片の長さ、外花被片の幅、外花被片の形、外花被片の色、外花被片の先端の形、外花被片の曲がり、内花被片の長さ、内花被片の幅、内花被片の形、内花被片の主な色、内花被片の二次色の有無、内花被片の二次色、内花被片の二次色の分布、内花被片の先端の形、内花被片の曲がり、花の香り

表おおしまかんすげの項の次に次のように加える。

カレクス　トリフィダ	草姿、葉群の高さ、株幅、葉群の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の横断面の内曲の強弱、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の色

表ケラトステイグマ　ウィルモッティアヌム（えりまつりぐさ）の項の次に次のように加える。

ハナズオウ	樹姿、当年枝の節間長、当年枝の色、当年枝の皮目の明瞭度、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の横断面の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の基部の重なり、新葉の色、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の有無、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の模様、葉身の裏面の主な色、葉身の表面の凹凸、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の裏面の毛の有無、葉身の裏面の毛の分布、葉身の周縁の波打ち、葉柄の長さ、葉柄の色、花序の花数、花序の直径、花柄の長さ、花柄の色、花の長さ、がくの色、旗弁の内面の主な色、旗弁の内面の二次色、翼弁の内面の主な色、翼弁の内面の二次色、竜骨弁の外面の主な色、竜骨弁の外面の二次色、開花期

表においあらせいとうの項を次のように改める。

カスマンティウム　ラティフォリウム	茎の長さ、葉しょうの長さ、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうの毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色、葉身の裏面の緑色の濃淡、葉身の横断面の形、葉身の毛の有無、止め葉の長さ、止め葉の幅、小穂の向き、小穂の長さ、小穂の幅、小穂のアントシアニン着色の有無、頴の数

表エリシムムの項の次に次のように加える。

エリシムム	草型、草丈、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の縦断面の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の表面のアントシアニンの着色、葉の周縁の鋸歯の有無、葉の周縁の鋸歯の数、葉の波打ち、花序の幅、一花序の花数、花らいに対する花の位置、小花柄の長さ、花型、花径、がくの長さ、がくの色、花弁の重なり、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の先端部の形、花弁の先端部の欠刻、花弁の基部の形、花弁の波打ち、開花初期の花弁の色、花弁の主な色、花弁の二次色、開花後期の花弁の主な色、開花後期の花弁の二次色、花弁の脈の明瞭度、花の香り、開花始期（種子繁殖性品種に限る。）
エスカリョニア　ラエウィス	樹姿、枝の粗密、当年枝の横断面の形、当年枝のアントシアニンの着色、当年枝の軟毛の有無、当年枝の軟毛の粗密、当年枝の腺毛の有無、当年枝の腺毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、新葉の表面の主な色、葉の表面の主な色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の斑の模様、葉の光沢の強弱、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の鋸歯の有無、葉の鋸歯の分布、葉の鋸歯の型、花序の型、花序の長さ、花序の幅、一花序の花数、花の長さ、花の幅、花の長さ／幅、花筒部の表面の色、花冠裂片の表面の色、花冠裂片の裏面の色、花冠裂片の向き、花冠裂片の重なり