25145　ナトリウム＝4－[(1－メトキシプロパン－2－イル)オキシ]－2－メチルベンゾアート　4－(4)－1388

25146　9－（2－ナフチル）－9'－フェニル－3，3'－ビ（9*H*－カルバゾール）　8－(1)－4048

25147　二ナトリウム＝3－アセトアミドナフタレン－1，5－ジスルホナート　5－1503

25148　3，3－ビス［4－（オキシラン－2－イルメトキシ）フェニル］－2－フェニルイソインドリン－1－オンを主成分とする，2－（クロロメチル）オキシランと3，3－ビス（4－ヒドロキシフェニル）－2－フェニルイソインドリン－1－オンの反応生成物　8－(1)－4049

25149　1，1'－ビス（2，6－ジメトキシフェニル)－1，1'－[(2，4，4－トリメチルペンチル）ホスホリル］ジメタノン　4－(3)－205

25150　1，1－ビス（4－トリル）エテン　7－(4)－1322

25151　5，5'－ビス［ビス（3，5－ジ－*tert*－ブチル－4－メトキシフェニル）ホスホリル］－4，4'－ビ（1，3－ベンゾジオキソール）　8－(5)－482

25152　*N*，*N*'－ビス（1－ヒドロキシプロパン－2－イル）－4－[(3－メチル－2，7－ジオキソ－2，7－ジヒドロ－3*H*－ナフト［1，2，3－*de*］キノリン－6－イル）アミノ］ベンゼン－1，3－ジスルホンアミドとα－ヒドロ－ω－メトキシポリ［オキシエチレン／オキシ（メチルエチレン)］の1：2エーテル化反応生成物　10－3497

25153　ビス（1－ブチル－3－メチル－$\eta^5$－シクロペンタジエニド)(ジクロリド）ジルコニウム　1－(2)－297

25154　（*E*）－3，4－ビス（ベンジルオキシ）－6－［4－（トリフルオロメチル）スチリル］ピリダジン　8－(2)－2652

25155　ビス（2－メトキシエトキシ）－$\lambda^2$－ブルンバンと2－メトキシエタノールの混合物　2－(8)－842

25156　2－ヒドロキシ－5－オクタノイル安息香酸　4－(4)－1389

25157　[(2*R**S*）－2－（1－ヒドロキシシクロヘキシル）－2－（4－メトキシフェニル）エチル](ジメチル）アンモニウム＝クロリド　7－(4)－1323

25158　[(3*S*）－6－ヒドロキシ－2，3－ジヒドロ－1－ベンゾフラン－3－イル］酢酸　8－(4)－2016

25159　（4－ヒドロキシ－3，5－ジメチルフェニル)(ジフェニル）スルホニウム＝メタンスルホナート　4－(2)－360

25160　6－ヒドロキシ－8－((1*R*）－1－ヒドロキシ－2－{[1－（4－メトキシフェニル）－2－メチルプロパン－2－イル］アミノ}エチル）－2*H*－1，4－ベンゾオキサジン－3（4*H*）－オン一塩酸塩　8－(7)－1872

25161　5'－（4－ヒドロキシフェニル)［1，1'：3'，1"－テルフェニル］－4，4"－ジオール　7－(3)－1048

25162　2－（ビニルオキシ）エチル＝アダマンタン－1－カルボキシラート　7－(2)－332

25163　3－ビニル［1，4］ベンゾジオキシノ［2，3－*c*］ピリダジン　8－(2)－2653

25164　1，1'－(1，4－フェニレンビス{[(*Z*)－メタン－1－イル－1－イリデン](7，7－ジメチル－2－オキソビシクロ［2．2．1］ヘプタン－1－イル－3－イリデン)}）ジメタンスルホン酸　7－(2)－333

25165　フェネチル＝デカノアート　4－(7)－2564

25166　*tert*－ブチル＝（2－アミノ－5－ニトロベンジル）カルバマート　4－(6)－440

25167　*tert*－ブチル＝2－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする，オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル＝アクリラート・α－［ブチル（ジメチル）シリル］－ω－［3－（メタクリロイルオキシ）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］共重合物　9－3322

25168　*tert*－ブチル＝2－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする，オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・α－［ブチル（ジメチル）シリル］－ω－［3－（メタクリロイルオキシ）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］共重合物　9－3323

25169　*tert*－ブチル＝[(2*S*）－1－シアノ－1－ヒドロキシ－3－フェニルプロパン－2－イル］カルバマート　4－(6)－441

25170　*tert*－ブチル＝（2，5－ジアミノベンジル）カルバマート　4－(6)－442

25171　*tert*－ブチル＝[(2*S*）－4－（シクロプロピルアミノ）－3－ヒドロキシ－4－オキソ－1－フェニルブタン－2－イル］カルバマート　4－(6)－443

25172　*tert*－ブチル（ジフェニル)シラノールと3－*O*－ベンジル－4－*C*－[(ベンジルオキシ）メチル］－6－*O*－［*tert*－ブチル（ジフェニル）シリル］－5－デオキシ－1，2－*O*－イソプロピリデン－β－L－*lyxo*－ヘキソフラノースの混合物　8－(5)－483

25173　*N*－［*tert*－ブチル（チオカルバモイル)］－2－フルアミド　8－(4)－2017

25174　*tert*－ブチル＝[(2*S*）－1－ヒドロキシ－3－フェニルプロパン－2－イル］カルバマート　4－(6)－444

25175　α－*tert*－ブチル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）　10－3498

25176　*tert*－ブチル＝（*E*）－7－［4－（4－フルオロフェニル）－6－イソプロピル－2－(*N*－メチルメタンスルホンアミド)ピリミジン－5－イル］－3，5－ジオキソヘプター6－エノアート　8－(2)－2654

25177　*tert*－ブチル＝[(1*S*）－1－ホルミル－2－フェニルエチル］カルバマート　4－(6)－445

25178　（3*S*）－3－[(*tert*－ブトキシカルボニル）アミノ］－2－ヒドロキシ－4－フェニルブタン酸　4－(4)－1390

25179　（2*S*）－3－［1－（*tert*－ブトキシカルボニル）－1*H*－イミダゾール－4－イル］－2－{[(9*H*－フルオレン－9－イルメトキシ）カルボニル］アミノ}プロパン酸　8－(2)－2655

25180　（不飽和脂肪酸（C＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（C＝36）を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。))と無水マレイン酸の1：2イミド化反応生成物　10－3499

25181　2－フルオロ－2－メチルプロパン酸　2－(4)－1298

25182　（*E*）－3－（プロパ－1－エン－1－イルオキシ）プロパン－1，2－ジオールと（*Z*）－3－（プロパ－1－エン－1－イルオキシ）プロパン－1，2－ジオールと3－[(1，1，1，3，5，5，5－ヘプタメチルトリシロキサン－3－イル)オキシ]プロパン－1，2－ジオールと3－［3－（1，1，1，3，5，5，5－ヘプタメチルトリシロキサン－3－イル）プロポキシ］プロパン－1，2－ジオール（主成分）の混合物　2－(3)－529

25183　プロピル＝（3*R*，5*S*，*E*)－7－[4－(4－フルオロフェニル)－6－イソプロピル－2－（*N*－メチルメタンスルホンアミド）ピリミジン－5－イル］－3，5－ジヒドロキシヘプター6－エノアート　8－(2)－2656

25184　（*E*）－4－ブロモ－4'－クロロスチルベン　7－(4)－1324

25185　2－ブロモ－2－（2－クロロフェニル）アセチル＝ブロミド　4－(7)－2565

25186　3－ブロモ－9－（2－ナフチル）－9*H*－カルバゾール　8－(1)－4050

25187　7－ブロモピリド［2，3－*b*］ピラジン－2（1*H*）－オン　8－(2)－2657

25188　2－ブロモ－5－（2－フルオロ－2－メチルプロパンアミド）－1，3－チアゾール－4－カルボキサミド　8－(7)－1873