| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）シクロヘキサン（濃度が80質量％を超えるもの） | 1,1-Di-(tert-butylperoxy) cyclohexane, more than 80% | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）フタレート（濃度が55質量％を超える溶液） | Di-(tert-butylperoxy) phthalate, more than 55% in solution | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| 2,2-ジ-（ターシャリーブチルパーオキシ）ブタン（濃度が55質量％を超える溶液） | 2,2-Di-(tert-butylperoxy) butane, more than 55% in solution | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| a,a'-ジ-（ニトロキシ）メチルエーテル | a,a'-Di-(nitroxy) methylether | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| ジ-1-ハイドロキシテトラゾール（乾性のもの） | Di-(1-hydroxytetrazole) (dry) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| ジ-2,4-ジクロロベンゾイルパーオキサイド（濃度が77質量％以下で、水を23質量％以上含有するもの） | Di-2,4-dichlorobenzoyl peroxide, not more than 77% when with 23% or more water | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| ジ-4-クロロベンゾイルパーオキサイド（濃度が77質量％以下で23質量％以上の水を含有するもの） | Di-4-chlorobenzoyl peroxide, not more than 77%, when with 23% or more water | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| ジ-N-ブチルパーオキシジカーボネート（濃度が52質量％を超える溶液） | Di-n-butyl peroxydicarbonate, more than 52% in solution | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 積載禁止 | － | 積載禁止 | － | － |
| ジ－Ｎ－プロピルエーテル | DI-N-PROPYL ETHER | 2384 | 3 | － | － | G | 2 | E2 | Y341 | 1ℓ | 353 | 5ℓ | 364 | 60ℓ | － |
| 次亜塩素酸塩（水溶液） | HYPOCHLORITE SOLUTION | 1791 | 8 | － | － | Q | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y840<br>Y841 | 0.5ℓ<br>1ℓ | 851<br>852 | 1ℓ<br>5ℓ | 855<br>856 | 30ℓ<br>60ℓ | A3 |
| 次亜塩素酸カルシウム（水和物で水の含有率が5.5質量％以上16質量％以下のものに限る。） | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED with not less than 5.5% but not more than 16% water | 2880 | 5.1 | － | － | K | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y544<br>Y546 | 2.5kg<br>10kg | 558<br>559 | 5kg<br>25kg | 562<br>563 | 25kg<br>100kg | A3<br>A8<br>A136 |
| 次亜塩素酸カルシウム（腐食性のもの）（乾性のもので有効塩素の含有率が39質量％を超えるもの（有効酸素の含有量が8.8質量％のものに限る。）） | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) | 3485 | 5.1 | － | 8 | K<br>Q | 2 | E2 | Y544 | 2.5kg | 558 | 5kg | 562 | 25kg | A136 |
| 次亜塩素酸カルシウム（腐食性のもの）（水和物で水の含有率が5.5質量％以上16質量％以下のものに限る。） | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water | 3487 | 5.1 | － | 8 | K<br>Q | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y544<br>Y545 | 2.5kg<br>5kg | 558<br>559 | 5kg<br>25kg | 562<br>563 | 25kg<br>100kg | A8<br>A136 |
| 次亜塩素酸カルシウム（乾性のもの） | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY | 1748 | 5.1 | － | － | K | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y544<br>Y546 | 2.5kg<br>10kg | 558<br>559 | 5kg<br>25kg | 562<br>563 | 25kg<br>100kg | A136 |
| 次亜塩素酸カルシウム混合物（乾性のもので有効塩素の含有率が10質量％を超え39質量％以下のものに限る。） | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine | 2208 | 5.1 | － | － | K | 3 | E1 | Y546 | 10kg | 559 | 25kg | 563 | 100kg | A136 |
| 次亜塩素酸カルシウム混合物（水和物で水の含有率が5.5質量％以上16質量％以下のものに限る。） | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE with not less than 5.5% but not more than 16% water | 2880 | 5.1 | － | － | K | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y544<br>Y546 | 2.5kg<br>10kg | 558<br>559 | 5kg<br>25kg | 562<br>563 | 25kg<br>100kg | A3<br>A8<br>A136 |
| 次亜塩素酸カルシウム混合物（乾性のもので有効塩素の含有率が39質量％を超えるもの（有効酸素の含有量が8.8質量％のものに限る。）） | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) | 1748 | 5.1 | － | － | K | 2<br>3 | E2<br>E1 | Y544<br>Y546 | 2.5kg<br>10kg | 558<br>559 | 5kg<br>25kg | 562<br>563 | 25kg<br>100kg | A138 |
| 次亜塩素酸カルシウム混合物（腐食性のもの）（乾性のもので有効塩素の含有率が10質量％を超え39質量％以下のものに限る。） | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine | 3486 | 5.1 | － | 8 | K<br>Q | 3 | E1 | Y545 | 5kg | 559 | 25kg | 563 | 100kg | A136 |