2　栽植密度

畝幅・株間測定		畝幅（11けい間の長さ）	株間（11株間の長さ）	1㎡当たり株数（けい長）	刈取り株数
		cm	cm	株（cm）	株
	Ⅰ			・	
	Ⅱ			・	
	Ⅲ			・	
	合計	(1)	(2)		
	平均	(3) (1)/30 ・	(4) (2)/30 ・		
	(5) 1㎡当たり株数 $\frac{10,000}{(3)\times(4)}$		株	1㎡当たりけい長 $\frac{10,000}{(3)}$	cm

3　刈取り調査

刈取り日	月　日	露	有　無
刈取り方法 3㎡当たり整数株刈り／3㎡刈り	① ②	調製方法 総合選別機／段ぶるい	① ②

刈取り試料		全量	縮分重量
	未調製生もみ重	g	
	未調製乾燥もみ重		g
	粗玄米重		
	玄米重		10a当たり換算率 $\frac{(5)\times1,000}{\text{刈取り株数計}}$
	くず米重		
	玄米水分	%	・

千粒重測定		1回	2回	合計
粗玄米	重量	g ・	g ・	g ・
	粒数	粒	粒	粒
玄米	重量	g ・	g ・	g
	粒数	粒	粒	粒
くず米	重量	g ・	g ・	g
	粒数	粒	粒	粒

再選別歩合
%

段別重量測定		総量	2.20以上	2.10	2.00	1.95	1.90
	1回	g	g	g	g	g	g
	2回						
	合計						

1.85	1.80	1.75	1.70	1.60	底
g	g	g	g	g	g

調査箇所の略図	標本単位区内水稲作付筆数	生育、登熟の特徴
全けい数　n＝　けい 間隔 $\frac{1}{3}$ n＝　けい ランダムスタート　a ＝第　けい	筆	

（記入注意）

1　合筆の上調製した場合は、合筆調製整理表から千粒重等を転記する。

2　総合選別機により調製した場合のくず米重は1.6㎜目以下、粗玄米重は玄米重とくず米重の合計重量とする。