25772 ナトリウム＝（*Z*）－［1－（1－メチル－1*H*－1，2，3，4－テトラゾール－5－イル）－1－フェニルメチリデン］アミノキシド－水（1／2） 8－(3)－1473

25773 二酸化ケイ素のフッ素化反応生成物 12－1124

25774 2－［(4－｛3－ニトロ－4－［(3－スルホプロピル)スルファニル］アニリノ｝－6－［(2－スルホエチル）アミノ］－1，3，5－トリアジン－2－イル）アミノ］ベンゼン－1，4－ジスルホン酸とそのナトリウム及びリチウム混合塩 8－(3)－1474

25775 二ナトリウム＝*N*－（7－オキシド－5－フェネチル［1，2，4］トリアゾロ［1，5－*a*］ピリジン－8－カルボニル）グリシナート 8－(1)－4100

25776 二ナトリウム＝4，4’－ジアクリルアミドビフェニル－2，2’－ジスルホナート 7－(3)－1055

25777 二ナトリウム＝5－［(2，6－ジクロロピリミジン－4－イル）アミノ］－5’－［(4，6－ジクロロピリミジン－2－イル）アミノ］－2，2’－（エテン－1，2－ジイル）ジベンゼンスルホナートと二ナトリウム＝5，5’－ビス［(2，6－ジクロロピリミジン－4－イル）アミノ］－2，2’－（エテン－1，2－ジイル）ジベンゼンスルホナートを主成分とする，2，4，6－トリクロロピリミジンと二ナトリウム＝5，5’－ジアミノ－2，2’－（エテン－1，2－ジイル）ジベンゼンスルホナートの反応生成物 8－(2)－2717

25778 ビス（4－アミノフェネチル）＝アジパート 4－(7)－2585

25779 ビス（4－アミノフェネチル）＝アジパート・ベンゼン－1，2：4，5－テトラカルボン酸二無水物重付加物 10－3570

25780 2，2－ビス｛［(3－スルファニルプロパノイル）オキシ］メチル｝プロパン－1，3－ジイル＝ビス(3－スルファニルプロパノアート)を連鎖移動剤とし，末端に2－シアノプロパン－2－イル基を有する，2－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・トリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－8－イル＝アクリラート共重合物 9－3388

25781 （5－｛［2，6－ビス（2－ナフチルオキシ)ピリミジン－4－イル］アミノ｝－5’－｛［4，6－ビス（2－ナフチルオキシ)ピリミジン－2－イル］アミノ｝－2，2’－（エテン－1，2－ジイル）ジベンゼンスルホン酸とそのナトリウム塩と5，5’－ビス｛［2，6－ビス（2－ナフチルオキシ）ピリミジン－4－イル］アミノ｝－2，2’－（エテン－1，2－ジイル）ジベンゼンスルホン酸とそのナトリウム塩）を主成分とする，塩化水素と｛［2，4，6－トリクロロピリミジンと二ナトリウム＝5，5’－ジアミノ－2，2’－(エテン－1，2－ジイル）ジベンゼンスルホナートの反応生成物］とナトリウム＝ナフタレン－2－オラートの反応生成物｝の反応生成物 8－(2)－2718

25782 ビス（4－ニトロフェネチル）＝アジパート 4－(7)－2586

25783 ビス［1，1’－（ブチルイミノ－κN)ビス(プロパン－2－オラト－κO)］スズ 1－(1)－776

25784 （4－ヒドロキシ－3，5－ジメチルフェニル)(ジフェニル）スルホニウム＝ヨージド 4－(2)－365

25785 ヒドロキシド（モノ（又はポリ）ブロモフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）アルミニウム 1－(1)－777

25786 1－（2－｛4－［6－ヒドロキシ－2－(4－ヒドロキシフェニル)－1－ベンゾチオフェン－3－カルボニル］フェノキシ｝エチル）ピペリジン－1－イウム＝クロリド－水（1／1） 8－(1)－4101

25787 *N*－ヒドロキシ－1－（1－メチル－1*H*－1，2，3，4－テトラゾール－5－イル）－1－フェニルメタンイミン 8－(3)－1475

25788 *N*－｛9－［(2*R*，6*S*）－6－（ヒドロキシメチル）－4－トリチルモルホリン－2－イル］－6－オキソ－6，9－ジヒドロ－1*H*－プリン－2－イル｝－2－フェノキシアセトアミド 8－(7)－1892

25789 *N*－｛9－［(2*R*，6*S*）－6－（ヒドロキシメチル）モルホリン－2－イル］－6－オキソ－6，9－ジヒドロ－1*H*－プリン－2－イル｝－2－フェノキシアセトアミド＝4－メチルベンゼンスルホナート 8－(7)－1893

25790 （*R*）－［1，1’－ビナフタレン］－2，2’－ジイル＝ビス（トリフルオロメタンスルホナート） 5－1515

25791 4－ビニルフェニル＝（*E*）－3－（4－メトキシフェニル）アクリラート・6－（4－ビニルフェノキシ）ヘキサン－1－オール共重合物 9－3389

25792 *N*－（ビフェニル－4－イル）－*N*－［4－（9－フェニル－9*H*－カルバゾール－3－イル）フェニル］［1，1’：4’，1”－テルフェニル］－4－アミン 8－(1)－4102

25793 表面に3，4－ジカルボキシフェニル基のジアンモニウム塩を有する，カーボンブラック 12－1125

25794 *tert*－ブチル＝（*trans*－4－エチニルシクロヘキシル）カルバマート 3－(4)－763

25795 *tert*－ブチル＝2－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする，*α*－アクリロイル－*ω*－（アクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）－ポリ［オキシ（メチルエチレン)］－ポリ（オキシエチレン）・*α*－アクリロイル－*ω*－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）－ポリ［オキシ（メチルエチレン)］－ポリ（オキシエチレン）・イソブチル＝メタクリラート・2－｛［({1，3－ビス［(3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル）オキシ］プロパン－2－イル｝オキシ）カルボニル］アミノ｝エチル＝メタクリラート・2－［({2，3－ビス［(3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル）オキシ］プロポキシ｝カルボニル）アミノ］エチル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・*α*－［ブチル（ジメチル）シリル］－*ω*－［3－（メタクリロイルオキシ）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］・メチル＝メタクリラート共重合物 9－3390

25796 2－ブチル－4－オキソ－1，3－ジアザスピロ［4．4］ノナ－1－エン－1－イウム＝クロリド 8－(2)－2719

25797 *tert*－ブチル＝［6－（クロロメチル）－2－ピリジル］カルバマート 8－(1)－4103

25798 （1a*R*，5*S*，8*S*，10*R*，22a*R*）－5－*tert*－ブチル－*N*－［(1*R*，2*S*）－1－（シクロプロパンスルホニルカルバモイル）－2－ビニルシクロプロピル］－14－メトキシ－3，6－ジオキソ－1，1a，3，4，5，6，9，10，18，19，20，21，22，22a－テトラデカヒドロ－8*H*－7，10－メタノシクロプロパ［18，19］［1，10，3，6］ジオキサジアザシクロノナデシン［11，12－*b*］キノキサリン－8－カルボキサミド－水（1／1） 8－(7)－1894

25799 1－*sec*－ブチルシクロペンタノール 3－(3)－208

25800 1－*sec*－ブチルシクロペンチル＝メタクリラート 3－(3)－209

25801 4－*tert*－ブチルジベンゾ［*b*，*d*］フラン 8－(4)－2044

25802 *N*－｛9－［(2*R*，6*S*）－6－（{[*tert*－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝メチル）－4－トリチルモルホリン－2－イル］－6－オキソ－6，9－ジヒドロ－1*H*－プリン－2－イル｝－2－フェノキシアセトアミド 8－(7)－1895

25803 *N*－｛9－［(2*R*，6*S*）－6－（{[*tert*－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝メチル）－4－トリチルモルホリン－2－イル］－6－（2－シアノエトキシ）－9*H*－プリン－2－イル｝－2－フェノキシアセトアミド 8－(7)－1896

25804 9－［(2*R*，6*S*）－6－（{[*tert*－ブチル（ジメチル）シリル］オキシ｝メチル）－4－トリチルモルホリン－2－イル］－2－（2－フェノキシアセトアミド）－9*H*－プリン－6－イル＝2，4，6－トリメチルベンゼンスルホナート 8－(7)－1897

25805 6－*tert*－ブチル－*N*－（2－トリル）ジベンゾ［*b*，*d*］フラン－4－アミン 8－(4)－2045