| | | |
|---|---|---|
| サフラン | 粉末の場合 | 二七mg |
| サンザシ | エキスの場合 | 三〇mg |
| サンヤク | エキスの場合 | 八〇〇mg |
| | 粉末の場合 | 三〇mg |
| シゴカ | エキスの場合 | 二〇〇〇mg |
| シャクヤク | エキスの場合 | 一二〇mg |
| シュクシャ | 粉末の場合 | 四七・五mg |
| ショウキョウ | エキスの場合 | 一〇〇〇mg |
| ジョテイシ | エキスの場合 | 一〇〇〇mg |
| セイヨウサンザシ | エキスの場合 | 一五〇mg |
| タイソウ | エキスの場合 | 七五〇mg |
| チョウジ | 粉末の場合 | 五〇mg |
| チンピ | エキスの場合 | 一〇〇mg |
| トウキ | エキスの場合 | 六〇〇mg |
| トシシ | エキスの場合 | 三〇〇mg |
| | 粉末の場合 | 五〇mg |
| トチュウ | エキスの場合 | 六〇〇mg |
| | 粉末の場合 | 五〇mg |
| ニクジュヨウ | エキスの場合 | 二五〇〇mg |
| | 粉末の場合 | 五〇mg |
| ニンジン | エキスの場合 | 三g |
| | 粉末の場合 | 一・五g |
| ニンニク | エキスの場合 | 四〇〇mg |
| ブクリョウ | エキスの場合 | 五五〇mg |
| | 粉末の場合 | 三〇〇mg |
| ムイラプアマ | エキスの場合 | 七五〇mg |
| モッコウ | 粉末の場合 | 三一・五mg |
| ヤクチ | 粉末の場合 | 一〇〇mg |
| ヨクイニン | エキスの場合 | 一〇g |
| | 粉末の場合 | 三g |
| リュウガンニク | エキスの場合 | 三〇〇mg |
| ローヤルゼリー | | 五〇〇mg |

| | | |
|---|---|---|
| | 粉末の場合 | 二mg |
| | エキスの場合 | 三mg |
| | エキスの場合 | 八〇mg |
| | 粉末の場合 | 三mg |
| | エキスの場合 | 二〇〇mg |
| | エキスの場合 | 一二mg |
| | 粉末の場合 | 四mg |
| | エキスの場合 | 一〇〇mg |
| | エキスの場合 | 一〇〇mg |
| | エキスの場合 | 一五mg |
| | エキスの場合 | 七五mg |
| | 粉末の場合 | 五mg |
| | エキスの場合 | 一〇mg |
| | エキスの場合 | 六〇mg |
| | エキスの場合 | 三〇mg |
| | 粉末の場合 | 五mg |
| | エキスの場合 | 六〇mg |
| | 粉末の場合 | 五mg |
| | エキスの場合 | 二五〇mg |
| | 粉末の場合 | 五mg |
| | エキスの場合 | 〇・六g |
| | 粉末の場合 | 〇・三g |
| | エキスの場合 | 四〇mg |
| | エキスの場合 | 五五mg |
| | 粉末の場合 | 三〇mg |
| | エキスの場合 | 七五mg |
| | 粉末の場合 | 三mg |
| | エキスの場合 | 一〇mg |
| | 粉末の場合 | 一・〇g |
| | エキスの場合 | 三〇mg |
| | | 五〇mg |

（注）3中「硝酸又は塩酸チアミン」を「チアミン塩化物塩酸塩又はチアミン硝化物」に改め、（注）4中「塩酸ジセチアミン」を「セトチアミン塩酸塩水和物」に、「塩酸チアミン」を「チアミン塩化物塩酸塩」に改め、（注）5中「塩酸フルスルチアミン」を「フルスルチアミン塩酸塩」に改め、（注）7中「リン酸リボフラビンナトリウム」を「リボフラビンリン酸エステルナトリウム」に改め、（注）8中「酢酸レチノール、パルミチン酸レチノール、ビタミンA油」を「ビタミンA油、レチノール酢酸エステル、レチノールパルミチン酸エステル」に改め、（注）10中「コハク酸dl－α－トコフェロールカルシウム」を「トコフェロールコハク酸エステルカルシウム」に改め、（注）11中「酢酸ヒドロキソコバラミン」を「ヒドロキソコバラミン酢酸塩」に改め、（注）13中「グルコン酸カルシウム」を「グルコン酸カルシウム水和物」に、「乳酸カルシウム、リン酸水素カルシウム及び無水リン酸水素カルシウム」を「乳酸カルシウム水和物、無水リン酸水素カルシウム及びリン酸水素カルシウム水和物」に改める。

別表第十三の次に次の表を加える。

**別表第十三の二**

| 区分 | 効能及び効果 | 有効成分名 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 胃腸が弱く腹痛や下痢を起こしやすい | 別表第十三（以下この表において「表」という。）のXのA項に掲げる有効成分のうちL－グルタミン酸又は表のXIに掲げる有効成分のうちアセンヤク、カンゾウ、サンシ、サンヤク、シャクヤク、シュクシャ、ショウキョウ、タイソウ、ブクリョウ、モッコウ若しくはヤクチ |
| Ⅱ | 肩、首、腰又は膝の不調 | 表のXのA項に掲げる有効成分のうちL－イソロイシン、L－バリン若しくはL－ロイシン若しくはI項に掲げる有効成分又は表のXIに掲げる有効成分のうちトチュウ |
| Ⅲ | 筋力の低下 | 表のXのA項に掲げる有効成分又は表のVに掲げる有効成分のうちL－イソロイシン、L－バリン若しくはL－ロイシン |
| Ⅳ | 疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい | 表のⅠからⅢまでに掲げる有効成分、表のXのA項に掲げる有効成分のうちL－イソロイシン、カルニチン塩化物、L－グルタミン酸、タウリン、L－バリン若しくはL－ロイシン、表のXのJ項に掲げる有効成分、表のXのK項に掲げる有効成分のうちパンテチン又は表のXIに掲げる有効成分のうちオウセイ、加工ダイサン、（オキソアミジン）、ガラナ、コウジン、シゴカ、タイソウ、ニクジュヨウ、ニンジン、ニンニク若しくはローヤルゼリー |
| Ⅴ | 寝付きが悪い、眠りが浅い、目覚めが悪い | 表のXのA項に掲げる有効成分のうちグリシン又は表のXIに掲げる有効成分のうちサフラン、シゴカ、ショウキョウ、タイソウ、チョウジ、ブクリョウ若しくはリュウガンニク |
| Ⅵ | 肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥） | 表のⅡからⅣまでに掲げる有効成分、表のⅨのA項からC項までに掲げる有効成分、表のXのC項若しくはG項に掲げる有効成分のうちヨクイニン |
| Ⅶ | 冷えやすい、血行が悪い | 表のⅥに掲げる有効成分又は表のXIに掲げる有効成分のうち加工ダイサン、（オキソアミジン）、コウジン、サフラン、シャクヤク、ショウキョウ、トウキ、ニンジン若しくはニンニク |
| Ⅷ | 貧血気味である | 表のXのG項に掲げる有効成分 |
| Ⅸ | 骨又は歯の衰え | 表のⅢ若しくはⅤに掲げる有効成分又は表のXのF項に掲げる有効成分若しくはK項に掲げる有効成分のうち炭酸マグネシウム |