73　4，4′－オキシ二安息香酸・2，2′－ジアミノ－4，4′－（ヘキサフルオロプロパン－2，2－ジイル）ジフェノール・3，3′，5，5′－テトラキス（メトキシメチル）ビフェニル－4，4′－ジオール・トリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－3，8（又は3，9又は4，8）－ジカルボン酸・ビフェニル－4，4′－ジオール重縮合物とビシクロ［2．2．1］ヘプター5－エン－2，3－ジカルボン酸無水物のアミド酸化及びイミド化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3469

74　*cis*－シクロヘキサン－1，4－ジカルボン酸・*trans*－シクロヘキサン－1，4－ジカルボン酸・2－メチルペンタン－1，5－ジアミン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3470

75　アクリル酸・2－エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3546

76　アクリル酸・アクリロニトリル・スチレン・*N*－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・ブチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3547

77　アクリロニトリル・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3548

78　アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・［オキシランと4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノールの反応生成物］・テレフタル酸・［4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノールと2－メチルオキシランの反応生成物］・ベンゼン－1，2，4－トリカルボン酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3471

79　エテノール・［*N*－オクタデシルメタクリルアミドを主成分（90％以上）とする、*N*－（アルキル（C＝16～20、直鎖型））メタクリルアミド］・ビニル＝アセタート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3549

80　1，4：3，6－ジアンヒドログルシトール・ジフェニル＝カルボナート・ヘキサン－1，6－ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3472

81　9－ビニル－9*H*－カルバゾール・メチル＝アクリラート・メチル＝2－（ヒドロキシメチル）アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物のδ－ラクトン化物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3550

82　スチレン・ブチル＝メタクリラート・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3551

83　1，3，3－トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタン－2－オン　(4)－1978

84　ジフルオリドビス（オキサラト－κ^2O^1，O^2）リン酸（1－）リチウム　(2)－4165

85　3，9－ジメチル－6－オキサ－3，9－ジアザデカン－1－オール　(2)－4166

86　五ナトリウム＝6－クロロ－3，3′－（{6－［（2－スルホナトエチル）アミノ］－1，3，5－トリアジン－2，4－ジイル}ビス｛イミノ［2－クロロ－5－（3－スルホナトプロポキシ）－4，1－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナートと五ナトリウム＝6，6′－ジクロロ－3，3′－（{6－［（2－スルホナトエチル）アミノ］－1，3，5－トリアジン－2，4－ジイル}ビス｛イミノ［2－クロロ－5－（3－スルホナトプロポキシ）－4，1－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナート（主成分、95％以上）と四ナトリウム＝6，6′－ジクロロ－3，3′－（{6－ヒドロキシ－1，3，5－トリアジン－2，4－ジイル}ビス｛イミノ［2－クロロ－5－（3－スルホナトプロポキシ）－4，1－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナートの混合物　(5)－7016

87　2－（{4－［（2－アミノエチル）アミノ］－6－（ベンジルアミノ）－1，3，5－トリアジン－2－イル}アミノ）ベンゼン－1，4－ジスルホン酸とアンモニアと塩化ナトリウムと{［（クロロスルホニル）－1，8，15（又は1，8，18又は1，11，15又は1，18，22）－トリアザフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}］銅(Ⅱ)と［モノ（又はジ）（クロロスルホニル）－1，8（又は1，11又は1，15又は1，18又は1，25）－ジアザフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}］銅(Ⅱ)と［モノ（又はジ又はトリ）（クロロスルホニル）－1－アザフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}］銅(Ⅱ)と［モノ（又はジ又はトリ又はテトラ）（クロロスルホニル）フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}］銅(Ⅱ)の混合物｝の反応生成物　(5)－7017

88　四（ナトリウム（又はリチウム））＝2，5－ジヒドロキシ－6－（{4－［（6－メトキシ－5（又は7）－スルホナト－1，3－ベンゾチアゾール－2－イル）ジアゼニル］－5－メチル－2－（3－スルホナトプロポキシ）フェニル}ジアゼニル）ナフタレン－1，7－ジスルホナートと六（ナトリウム（又はリチウム））＝5－ヒドロキシ－4－{［5－ヒドロキシ－6－（{4－［（6－メトキシ－5（又は7）－スルホナト－1，3－ベンゾチアゾール－2－イル）ジアゼニル］－5－メチル－2－（3－スルホナトプロポキシ）フェニル}ジアゼニル）－1，7－ジスルホナト－2－ナフチル］ジアゼニル｝－1－（4－スルホナトフェニル）－1*H*－ピラゾール－3－カルボキシラート（主成分、95％以上）の混合物　(5)－7018

89　*N*，*N*′－ビス（2－｛3－［（*E*）－オクタデセニル］－2，5－ジオキソピロリジン－1－イル｝エチル）－*N*，*N*′－［（アセチルイミノ）ジエチレン］ジアセトアミドを主成分（50％以上）とする、{［（オクタデセンと無水マレイン酸の付加反応生成物）と3，6，9－トリアザウンデカン－1，11－ジアミンのイミド化反応生成物］と無水酢酸のアミド化反応生成物｝　(5)－7019

90　［（スルホフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）銅と（ロジンの水素化反応生成物）の混合物］のストロンチウム塩を主成分とする、塩化カルシウムと塩化ストロンチウムと［（モノ（又はジ）スルホフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）銅］と（ロジンの水素化反応生成物）の反応生成物　(5)－7020

91　ジオクチル＝（ジスルファンジイル）ジアセタート　(2)－4167

92　1，1，1，2，2，3，4，5，6，6，7，7，7－トリデカフルオロ－5－メトキシヘプター3－エンを主成分（40％以上）とする、トリデカフルオロ（メトキシ）ヘプテン　(2)－4168

93　シクロヘキサン－1，4－ジカルボン酸・4－ヒドロキシ安息香酸・ビフェニル－4，4′－ジオール重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3473

94　イソフタル酸・シクロヘキサン－1，4－ジカルボン酸・4－ヒドロキシ安息香酸・ビフェニル－4，4′－ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3474

95　5－エチルビシクロ［2．2．1］ヘプター2－エン・4，4a，9，9a－テトラヒドロ－1*H*－1，4－メタノフルオレン・ビシクロ［2．2．1］ヘプター5－エン－2，3－ジカルボン酸無水物共重合物（開環重合物に限る。）の水素化物（ベンゼン環が水素化されないものに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3552