トリエタノールアミン＝２－（２，４－ジクロロフェノキシ）プロピオン酸塩（別名ジクロルプロップトリエタノールアミン塩）	（２ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェノキシ）プロピオン酸（別名ジクロルプロップ［酸］）として18,000μg／１	（新規）
（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２，４－ジエニル）シクロペンター２－エニル＝（１Ｒ）－*trans*－２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパー１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート又は（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２，４－ジエニル）シクロペンター２－エニル＝（＋）－*trans*－クリサンテマート（別名ピレトリンⅠ）、（Ｚ）－（Ｓ）－３－（ブター２－エニル）－２－メチル－４－オキソシクロペンター２－エニル＝（１Ｒ）－*trans*－２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパー１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート又は（Ｚ）－（Ｓ）－３－（ブター２－エニル）－２－メチル－４－オキソシクロペンター２－エニル＝（＋）－*trans*－クリサンテマート（別名シネリンⅠ）、（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２－エニル）シクロペンター２－エニル＝（１Ｒ）－*trans*－２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパー１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート又は（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２－エニル）シクロペンター２－エニル＝（＋）－*trans*－クリサンテマート（別名ジャスモリンⅠ）、（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２，４－ジエニル）シクロペンター２－エニル＝（Ｅ）－（１Ｒ）－*trans*－３－（２－メトキシカルボニルプロパー１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート又は（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２，４－ジエニル）シクロペンター２－エニル＝ピレトラート（別名ピレトリンⅡ）、（Ｚ）－（Ｓ）－３－（ブター２－エニル）－２－メチル－４－オキソシクロペンター２－エニル＝（Ｅ）－（１Ｒ）－*trans*－３－（２－メトキシカルボニルプロパー１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート又は（Ｚ）－（Ｓ）－３－（ブター２－エニル）－２－メチル－４－オキソシクロペンター２－エニル＝ピレトラート（別名シネリンⅡ）及び（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２－ニエル）シクロペンター２－エニル＝（Ｅ）－（１Ｒ）－*trans*－３－（２－メトキシカルボニルプロパー１－エニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート又は（Ｚ）－（Ｓ）－２－メチル－４－オキソ－３－（ペンター２－エニル）シクロペンター２－エニル＝ピレトラート（別名ジャスモリンⅡ）の混合物（別名ピレトリン）	1.4μg／１	（新規）