| | | | |
|---|---|---|---|
| | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」マユ1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」綿布1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」綿1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」モミガラ1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」リンゴ1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | シンビット静注用50mg | 50mg1瓶 | 4,673 |
| | ジーンプラバ点滴静注625mg | 625mg25mL1瓶 | 330,500 |
| | シンポニー皮下注50mgシリンジ | 50mg0.5mL1筒 | 121,527 |
| | （す） | | |
| | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg | 100mg2mL1瓶 | 378 |
| | 水溶性ハイドロコートン注射液500mg | 500mg10mL1瓶 | 1,630 |
| 局 | 水溶性プレドニン10mg | 10mg1管 | 109 |
| 局 | 水溶性プレドニン20mg | 20mg1管 | 194 |
| 局 | スキサメトニウム塩化物注射液 | 2%1mL1管 | 92 |
| 局 | スキサメトニウム塩化物注射液 | 2%2mL1管 | 136 |
| 局 | スキサメトニウム塩化物注射液 | 2%5mL1管 | 159 |
| | スクラッチダニアレルゲンエキス「トリイ」100,000ＪＡＵ／mL | 1mL1瓶 | 7,966 |
| | スコルパン注20mg | 2%1mL1管 | 56 |
| | スズコロイドTc－99m注調製用キット | 1回分 | 2,643 |
| | ステイセーフバランス1.5　1／腹膜透析液 | 1.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,395 |
| | ステイセーフバランス1.5　1／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,420 |
| | ステイセーフバランス1.5　1／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋 | 1,212 |
| | ステイセーフバランス1.5　1／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,743 |
| | ステイセーフバランス2.5　1／腹膜透析液 | 1.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,361 |
| | ステイセーフバランス2.5　1／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,634 |
| | ステイセーフバランス2.5　1／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋 | 1,276 |
| | ステイセーフバランス2.5　1／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,702 |
| | ステイセーフバランス4.25　1／腹膜透析液 | 1Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,236 |
| | ステイセーフバランス4.25　1／腹膜透析液 | 1.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,357 |
| | ステイセーフバランス4.25　1／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋 | 811 |
| | ステイセーフバランス4.25　1／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,572 |
| | ステイセーフバランス1.5　2／腹膜透析液 | 1.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,037 |
| | ステイセーフバランス1.5　2／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,526 |
| | ステイセーフバランス1.5　2／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋 | 823 |
| | ステイセーフバランス1.5　2／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,597 |
| | ステイセーフバランス2.5　2／腹膜透析液 | 1.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 991 |
| | ステイセーフバランス2.5　2／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,298 |
| | ステイセーフバランス2.5　2／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋 | 638 |
| | ステイセーフバランス2.5　2／腹膜透析液 | 2.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,519 |
| | ステイセーフバランス4.25　2／腹膜透析液 | 1.5Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,271 |
| | ステイセーフバランス4.25　2／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋 | 848 |
| | ステイセーフバランス4.25　2／腹膜透析液 | 2Ｌ1袋(排液用バッグ付) | 1,547 |
| | ステラーラ点滴静注130mg | 130mg26mL1瓶 | 189,612 |
| | ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 45mg0.5mL1筒 | 437,038 |
| | ストレンジック皮下注12mg／0.3mL | 12mg0.3mL1瓶 | 131,859 |
| | ストレンジック皮下注18mg／0.45mL | 18mg0.45mL1瓶 | 197,788 |
| | ストレンジック皮下注28mg／0.7mL | 28mg0.7mL1瓶 | 307,671 |
| | ストレンジック皮下注40mg／1mL | 40mg1mL1瓶 | 439,530 |
| | ストレンジック皮下注80mg／0.8mL | 80mg0.8mL1瓶 | 879,061 |
| | スパニジン点滴静注用100mg | 100mg1瓶 | 44,094 |
| | スピンラザ髄注12mg | 12mg5mL1瓶 | 9,320,424 |
| | ズファジラン筋注5mg | 0.5%1mL1管 | 58 |
| | スプレキュアＭＰ皮下注用1.8 | 1.8mg1筒 | 27,448 |
| 局 | スベニールディスポ関節注25mg | 1%2.5mL1筒 | 1,082 |
| 局 | スベニールバイアル関節注25mg | 1%2.5mL1瓶 | 725 |
| 局 | スミフェロン注ＤＳ300万ＩＵ | 300万国際単位1筒 | 6,549 |
| 局 | スミフェロン注ＤＳ600万ＩＵ | 600万国際単位1筒 | 12,424 |
| 局 | スミフェロン注バイアル300万ＩＵ | 300万国際単位1瓶 | 6,549 |
| 局 | スルタムジン静注用0.5ｇ | (500mg)1瓶 | 275 |
| 局 | スルタムジン静注用1ｇ | (1ｇ)1瓶 | 304 |
| 局 | スルバクシン静注用0.75ｇ | (0.75ｇ)1瓶 | 256 |
| 局 | スルバクシン静注用1.5ｇ | (1.5ｇ)1瓶 | 294 |
| 局 | スルバクシン静注用3ｇ | (3ｇ)1瓶 | 345 |
| 局 | スルバシリン静注用0.75ｇ | (0.75ｇ)1瓶 | 256 |
| 局 | スルバシリン静注用1.5ｇ | (1.5ｇ)1瓶 | 294 |
| 局 | スルバシリン静注用3ｇ | (3ｇ)1瓶 | 345 |
| 局 | スルピリン注射液 | 10%2mL1管 | 92 |
| 局 | スルピリン注射液 | 25%1mL1管 | 92 |
| 局 | スルピリン注射液 | 25%2mL1管 | 92 |
| 局 | スルピリン注射液 | 50%1mL1管 | 92 |
| 局 | スルペラゾンキット静注用1ｇ | (1ｇ)1キット(生理食塩液100mL付) | 1,144 |
| 局 | スルペラゾン静注用0.5ｇ | (500mg)1瓶 | 631 |
| 局 | スルペラゾン静注用1ｇ | (1ｇ)1瓶 | 760 |
| | スロンノンＨＩ注10mg／2mL | 10mg2mL1管 | 2,228 |
| | （せ） | | |
| 局 | 生食注キット「フソー」 | 50mL1キット | 151 |
| 局 | 生食注キット「フソー」 | 100mL1キット | 149 |
| 局 | 生食注シリンジ「ＳＮ」5mL | 5mL1筒 | 95 |
| 局 | 生食注シリンジ「ＳＮ」10mL | 10mL1筒 | 95 |
| 局 | 生食注シリンジ「ＳＮ」20mL | 20mL1筒 | 117 |
| 局 | 生食注シリンジ「ＮＰ」 | 5mL1筒 | 95 |
| 局 | 生食注シリンジ「ＮＰ」 | 10mL1筒 | 95 |
| 局 | 生食注シリンジ「ＮＰ」 | 20mL1筒 | 117 |
| 局 | 生食注シリンジ「オーツカ」5mL | 5mL1筒 | 95 |
| 局 | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 10mL1筒 | 95 |