| | | | |
|---|---|---|---|
| エカルディ・グティエール症候群 | （略） | （略） | （略） |
| ＡＴＲ－Ｘ症候群 | 8 | ＡＴＲ－Ｘ症候群 | 運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合 |
| 筋ジストロフィー | 9～15 | （略） | （略） |
| | 16 | ９から15までに掲げるもののほか、筋ジストロフィー | 運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）が続く場合又は治療として強心薬、利尿薬、抗不整脈薬、末梢（しょう）血管拡張薬、β遮断薬、肺血管拡張薬、呼吸管理（人工呼吸器、気管切開術後、経鼻エアウェイ等の処置を必要とするものをいう。）、酸素療法、中心静脈栄養若しくは経管栄養の一つ以上を継続的に行っている場合 |
| 痙攣（けいれん）重積型急性脳症 | 17 | 痙攣（けいれん）重積型（二相性）急性脳症 | 運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| エカルディ・グティエール症候群 | （略） | （略） | （略） |
| （新設） | （新設） | （新設） | （新設） |
| 筋ジストロフィー | 8～14 | （略） | （略） |
| | （新設） | （新設） | （新設） |
| （新設） | （新設） | （新設） | （新設） |