脆弱Ｘ症候群	34	脆弱Ｘ症候群	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
（略）	35～39	（略）	（略）
先天性感染症	40～43	（略）	（略）
先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（ＧＰＩ）欠損症	44	先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（ＧＰＩ）欠損症	運動障害、知的障害、意識障害、自閉傾向、行動障害（自傷行為又は多動）、けいれん発作、皮膚所見（疾病に特徴的で、治療を要するものをいう。）、呼吸異常、体温調節異常、温痛覚低下、骨折又は脱臼のうち一つ以上の症状が続く場合
（略）	45・46	（略）	（略）
先天性ミオパチー	47～52	（略）	（略）
	53	47から52までに掲げるもののほか、先天性ミオパチー	（略）
（略）	54～62	（略）	（略）
乳児両側線条体壊死	63	（略）	（略）

（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	37～41	（略）	（略）
先天性感染症	42～45	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	46・47	（略）	（略）
先天性ミオパチー	48～53	（略）	（略）
	54	48から53までに掲げるもののほか、先天天性ミオパチー	（略）
（略）	55～63	（略）	（略）
乳児両側線条体壊死	64	（略）	（略）