イブキ	（略）
コエビソウ	（略）
（略）	（略）
ユウガオ	（略）
サルスベリ	（略）
（略）	（略）
カラマツ	（略）
（略）	（略）
ゲッケイジュ	（略）
（略）	（略）
レケナウルティア（ハツコイソウ）	（略）
（略）	（略）
（略）	（略）
イワナンテン	樹姿、樹高、株幅、冬期の葉群のアントシアニンの着色、新しょうの枝の色、新しょうの葉の主な色、新しょうの葉の斑の有無、新しょうの葉の斑の色、節間長、枝の太さ、枝のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の毛の有無、葉身の鋸歯の深さ、葉身の凹凸、葉身のねじれ、葉柄の長さ、花序の長さ、ほうの色、ほうの毛の多少、がくの色、花冠の長さ、花冠筒部の幅、花冠筒部の開口部の幅、花冠筒部の幅／開口部の幅、花冠裂片の反りの強弱、花冠の色、開花始期
（略）	（略）
ネズミモチ	（略）
ユリ	（略）
リモニウム	（略）
（略）	（略）
ヤブラン	（略）
（略）	（略）

いぶき	（略）
こえびそう	（略）
（略）	（略）
ゆうがお	（略）
さるすべり	（略）
（略）	（略）
からまつ	（略）
（略）	（略）
げっけいじゅ	（略）
（略）	（略）
レケナウルティア（はつこいそう）	（略）
（略）	（略）
アメリカイワナンテン	（略）
（新設）	（新設）
（略）	（略）
ねずみもち	（略）
ゆり	（略）
リモニウム（旧スターチス）	（略）
（略）	（略）
やぶらん	（略）
（略）	（略）