| | |
|---|---|
| スイレン（ヒツジグサ） | （略） |
| （略） | （略） |
| セリ | （略） |
| マツヨイグサ | （略） |
| （略） | （略） |
| ジャノヒゲ | （略） |
| （略） | （略） |
| 稲 | しょう葉のアントシアニンの着色、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じ、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色、初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色、初期の外穎頂部のアントシアニンの着色、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ(浮稲品種を除く。)、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じ、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニンの着色、後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色、後期の外穎頂部のアントシアニンの着色、護穎の長さ、護穎の色、籾の千粒重、籾の長さ、籾の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応による着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性、高温登熟性、着粒密度 |

| | |
|---|---|
| すいれん（ひつじぐさ） | （略） |
| （略） | （略） |
| せり | （略） |
| まつよいぐさ | （略） |
| （略） | （略） |
| じゃのひげ | （略） |
| （略） | （略） |
| 稲 | しょう葉のアントシアニン着色の強弱、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じの粗密、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外頴のキールのアントシアニン着色の強弱、初期の外頴頂部下のアントシアニン着色の強弱、初期の外頴頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外頴の毛じの粗密、外頴先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、頴の色、頴の模様、後期の外頴のキールのアントシアニン着色の強弱、後期の外頴頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外頴頂部のアントシアニン着色の強弱、護頴の長さ、護頴の色、籾の千粒重、籾の長さ、籾の幅、頴のフェノール反応の有無、頴のフェノール反応による着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性 |