ナナカマド	（略）
（略）	（略）
シモツケ	（略）
（略）	（略）
ソルガム	幼苗の子葉しょうのアントシアニンの着色、葉身のアントシアニンの着色、分げつ数、葉身の緑色の濃淡、葉の中肋の色、葉の中肋の変色の範囲、出穂期、穎のアントシアニンの着色、柱頭のアントシアニンの着色、柱頭の色、柱頭の長さ、小花の長さ、自家稔性、開花終期の穎の色、開花終期の穂の粒着の粗密、護穎の芒の長さ、葯の色、草丈、稈の直径、稈の節間の着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、穂の長さ、穂首の長さ、穂の分枝の長さ、穂の粗密、穂の最大幅の位置、穎の色、穎の長さ、子実の色、子実の千粒重、正面から見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実のタンニン含量、胚乳の質（縦断面）、胚乳のガラス質の色、日長感応性、茎の甘味、紫斑点病抵抗性
（略）	（略）
エゴノキ	（略）
（略）	（略）
センブリ	（略）
（略）	（略）
ハシドイ	樹姿、樹高、側枝の粗密、花序の数、枝の色、葉の型、葉の切れ込みの深さ、葉の切れ込みの数、葉の形、葉の基部の形、葉の主な色、葉の二次色、つぼみの色、花序の向き、花序の長さ、花序の型、花序の花の粗密、花の香り、花型、花冠の直径、花冠裂片の数、花冠の輪生の距離、花冠裂片の向き、花冠裂片の形、花冠裂片の波打ち、花冠裂片の縁の湾曲、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の内面の主な色、花冠裂片の内面の二次色、花筒の外面の色、やくの色、開花始期

ななかまど	（略）
（略）	（略）
しもつけ	（略）
（略）	（略）
ソルガム	幼苗の子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の裏面のアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身のアントシアニン着色の強弱、出穂期、出穂期の葉の高さ、出穂期の葉身の緑色の濃淡、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡、開花時の苞頴の色、開花時の頴のアントシアニン着色の強弱、開花時の頴の毛じのアントシアニン着色の強弱、開花時の護頴の芒の着生の強弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱、柱頭の長さ、小花の小花柄を含む長さ、開花終期の穂の粒着の粗密、開花終期の雄ずいの色、成熟期の草丈、稈の直径、成熟期の先端から三番目の葉の長さ、成熟期の葉の幅、成熟期の穂の長さ、成熟期の穂の分枝の長さ、成熟期の穂の粗密、成熟期の穂の形、成熟期の穂首の長さ、成熟期の頴の色、成熟期の頴の長さ、脱穀後の頴果の色、子実の千粒重、正面から見た子実の形、側面から見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実の種皮によって覆われた割合、子実のタンニン含量、胚乳の質（縦断面）、胚乳のガラス質の色、茎の甘味、紫斑点病抵抗性
（略）	（略）
えごのき	（略）
（略）	（略）
せんぶり	（略）
シンゴナンサス　クリサンサス	（略）
（新設）	（新設）