サンユウカ	（略）
（略）	（略）
ナツシロギク	（略）
イチイ	（略）
（略）	（略）
アスナロ	（略）
（略）	（略）
ディランジア	（略）
（略）	（略）
ユウギリソウ	（略）
テイカカズラ	（略）
（略）	（略）
アカクローバ	（略）
シロクローバ	（略）
（略）	（略）
コムギ	（略）
マカロニコムギ	子葉しょうのアントシアニンの着色、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、出穂期、止め葉の葉耳のアントシアニンの着色、止め葉の葉しょうの白粉、止め葉の白粉、稈の最上部の節に着生する毛、穂首の白粉、穂の白粉、草丈、稈の長さ、穂の芒の着生状態、穂の先端の芒の長さ、芒の長さ、護穎の形、護穎の肩部の形、護穎の肩部の幅、護穎のくちばしの長さ、護穎のくちばしの曲がり方、護穎の外側表面の毛の有無、穂首直下の節間の髄の厚さ、芒の色、穂の長さ、穂の着色、成熟期、稈の色、穂の粒着の粗密、原麦粒の刷毛の長さ、原麦粒の形、原麦粒の色、原麦粒のフェノール反応による着色、千粒重、まき性、Glu-A１遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B１遺伝子座にある対立遺伝子の発現

さんゆうか	（略）
（略）	（略）
なつしろぎく	（略）
いちい	（略）
（略）	（略）
あすなろ	（略）
（略）	（略）
ティランジア（旧チランドシア）	（略）
（略）	（略）
ゆうぎりそう	（略）
ていかかずら	（略）
（略）	（略）
あかクローバ	（略）
しろクローバ	（略）
（略）	（略）
小麦	（略）
（新設）	（新設）