別表第２（第２条関係）

１～５　（略）

６　飼料添加物一般の試験法

（略）

⑴～⑲　（略）

⑳　赤外吸収スペクトル測定法

（略）

装置　（略）

操作法　（略）

①～⑥　（略）

⑦　ＡＴＲ法

ＡＴＲ（減衰全反射）プリズム面に試料を密着させ、その反射スペクトルを測定する。

㉑～㊳　（略）

７　（略）

８　各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

⑴～㉒　（略）

㉓　アスタキサンチン

ア　製造用原体　（略）

イ　製剤（その１）　（略）

ウ　製剤（その２　液状）

㋐　成分規格

本品は、アスタキサンチン製造用原体に、変性食用デンプンを混合した製剤（その１）に、植物性油脂、軽質無水ケイ酸、グリセリン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルを混和した懸濁液である。

含量　本品は、定量するとき、表示量の90～120％に相当するアスタキサンチン（$C_{40}H_{52}O_4$）を含む。

確認試験　アスタキサンチン製剤（その１）の確認試験を準用する。

定量法　アスタキサンチン製剤（その１）の定量法を準用する。

㋑　保存の方法の基準

アスタキサンチン製剤（その１）の保存の方法の基準を準用する。

㋒　表示の基準

本品の直接の容器又は直接の被包に、次の文字を記載すること。

有効期間　製造の日から３か月

㉔～㊱　（略）

㊲　Ｌ－カルニチン

ア　製造用原体

㋐　成分規格

（略）

純度試験

①～⑥　（略）

別表第２（第２条関係）

１～５　（略）

６　飼料添加物一般の試験法

（略）

⑴～⑲　（略）

⑳　赤外吸収スペクトル測定法

（略）

装置　（略）

操作法　（略）

①～⑥　（略）

（新設）

㉑～㊳　（略）

７　（略）

８　各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

⑴～㉒　（略）

㉓　アスタキサンチン

ア　製造用原体　（略）

イ　製剤　（略）

（新設）

㉔～㊱　（略）

㊲　Ｌ－カルニチン

ア　製造用原体

㋐　成分規格

（略）

純度試験

①～⑥　（略）