ナタネ	種子のエルシン酸含有の有無	五万円
	春まき抽だい性	九万三千円
	晩夏まき抽だい性	九万三千円
カリフラワー	春作の収穫の早晩性	五万円
キャベツ	萎黄病レース１抵抗性の有無	十七万六千円
アブラナ（在来ナタネ（ハクサイ及びカブを除く。））	根こぶ病抵抗性	二十万円
ハクサイ	カブモザイクウイルス抵抗性	十七万六千円
	根こぶ病抵抗性	二十万円
ミシマサイコ	エタノールエキス含有率	一万七千円
	乾物率	一万七千円
茶	発酵性	一万二千円
	カフェイン含量	十三万五千円
アサ	テトラ・ヒドロ・カンナビノール酸の多少	七万五千円
トウガラシ	辛味の強弱（観賞用品種を除く。）	十三万五千円
	トバモウイルス抵抗性　病原型０（観賞用品種を除く。）	五万円
	トバモウイルス抵抗性　病原型１（観賞用品種を除く。）	十七万六千円
	トバモウイルス抵抗性　病原型１－２（観賞用品種を除く。）	五万円
	トバモウイルス抵抗性　病原型１－２－３（観賞用品種を除く。）	五万円
	ジャガイモＹウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。）	二十万円
	疫病抵抗性（観賞用品種を除く。）	二十二万五千円
	キュウリモザイクウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。）	二十万円
	トマト黄化えそウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。）	二十万円
	斑点細菌病抵抗性（観賞用品種を除く。）	十七万六千円
	青枯病抵抗性（観賞用品種を除く。）	二十万円
ベニバナ	色素含有率	十三万五千円
	油脂含有率	五万円
	乾物率	一万七千円
スイカ	つる割病レース０抵抗性	二十万円
	つる割病レース１抵抗性	二十万円
	つる割病レース２抵抗性	二十万円
	炭そ病レース１抵抗性	二十万円
メロン	つる割病レース０抵抗性	六万円
	つる割病レース１抵抗性	六万円
	つる割病レース２抵抗性	六万円
	つる割病レース１－２抵抗性	二十万円
	うどんこ病（Podosphaera xanthii レース１）抵抗性	十七万六千円
	うどんこ病（Podosphaera xanthii レース２）抵抗性	十七万六千円
	うどんこ病（Podosphaera xanthii レース５）抵抗性	十七万六千円
	うどんこ病（Golovinomyces cichoracearum レース１）抵抗性	十七万六千円
	ワタアブラムシ抵抗性	十七万六千円
	ズッキーニ黄斑モザイクウイルス抵抗性	十七万六千円
	パパイヤ輪点ウイルス系統Guadeloupe抵抗性	二十万円
	パパイヤ輪点ウイルス系統Ｅ２抵抗性	二十万円
	マスクメロンえそ斑点ウイルス抵抗性	十七万六千円
	キュウリモザイクウイルス抵抗性	十七万六千円
キュウリ	黒星病抵抗性	十七万六千円
	キュウリモザイクウイルス抵抗性	十七万六千円
	うどんこ病抵抗性	十七万六千円