外穎のフェノール反応による着色	一万七千円
精米のアルカリ崩壊性	（略）
（略）	（略）
（削る）	（削る）
（略）	（略）
高温登熟性	十八万千円
（削る）	（削る）
グルテリン含量	七万三千円
（削る）	（削る）
カドミウム吸収性	十八万四千円
（削る）	（削る）
セシウム吸収性	十八万三千円
（削る）	（削る）
穂発芽性	一万七千円
（削る）	（削る）
ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	十万二千円
（削る）	（削る）
いもち病抵抗性推定遺伝子型	十四万八千円
（削る）	（削る）
葉いもちほ場抵抗性	十一万九千円
（削る）	（削る）
穂いもちほ場抵抗性	十九万二千円
（削る）	（削る）
白葉枯病抵抗性品種群別	十六万二千円
（削る）	（削る）
白葉枯病ほ場抵抗性	十六万二千円
（削る）	（削る）
しま葉枯病抵抗性品種群別	十二万三千円

（新設）	（新設）
精米のアルカリ崩壊性の強弱	（略）
（略）	（略）
穂発芽性	一万七千円
耐倒伏性	（略）
（新設）	（新設）
いもち病抵抗性推定遺伝子型	十四万八千円
（新設）	（新設）
葉いもちほ場抵抗性	十一万九千円
（新設）	（新設）
穂いもちほ場抵抗性	十九万二千円
（新設）	（新設）
白葉枯病抵抗性品種群別	十六万二千円
（新設）	（新設）
白葉枯病ほ場抵抗性	十六万二千円
（新設）	（新設）
しま葉枯病抵抗性品種群別	十二万三千円
（新設）	（新設）
ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	十七万三千円
（新設）	（新設）
トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	十二万三千円
（新設）	（新設）
グルテリン含量	七万三千円
（新設）	（新設）
カドミウム吸収性	十八万四千円
（新設）	（新設）
高温登熟性	十八万千円
（新設）	（新設）