定量法　本品約100mgを有効数字３桁まで量り、10mLの褐色全量フラスコに入れ、内標準溶液５mLを全量ピペットを用いて量り、加え、よく振り混ぜ、バイアルに移し、試料溶液とする。この溶液につき、３―ニトロオキシプロパノール製造用原体の定量法に定める測定条件でガスクロマトグラフ法により試験を行う。試料溶液注入後、測定時間に現れる、エタノール由来のピーク及びノナン酸メチルのピークを除いた、全ての成分のピーク面積の総和を100とし、それに対する３―ニトロオキシプロパノールのピーク面積百分率を求める。

５―ニトロソ―８―オキシキノリン～濃ヨウ化カリウム試液　（略）

ノナン酸メチル　$CH_3(CH_2)_7COOCH_3$　99.8%以上

Ｌ―ノルロイシン～プロピオン酸ナトリウム、定量用　（略）

プロピレングリコール　$CH_3CH(OH)CH_2OH$〔特級〕

ブロムクレゾールグリーン～マレイン酸　（略）

水、誘導結合プラズマ分析用　H_2O〔日局〕

無アルデヒドエタノール～レゾルシン　（略）

⑶　（略）

⑷　標準液

（略）

亜鉛標準液～水・メタノール標準液　（略）

誘導結合プラズマ質量分析用ゲルマニウム標準液　計量法で規定される標準液。この液１mLはゲルマニウム（Ge）１mgを含む。

誘導結合プラズマ質量分析用鉛標準液　計量法で規定される標準液。この液１mLは鉛（Pb）１mgを含む。

誘導結合プラズマ質量分析用ビスマス標準液　計量法で規定される標準液。この液１mLはビスマス（Bi）１mgを含む。

誘導結合プラズマ質量分析用ヒ素標準液　計量法で規定される標準液。この液１mLはヒ素（As_2O_3）1.3mgを含む。

リン酸塩pH標準液～リン標準液　（略）

⑸～⑼　（略）

８　各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

⑴～⑹⑻　（略）

⑹⑼　３―ニトロオキシプロパノール

ア　製造用原体

⑺　成分規格

含量　本品は、定量するとき、３―ニトロオキシプロパノール（$C_3H_7NO_4$）98.0%以上を含む。

物理的・化学的性質

①　本品は、無色～淡黄色の透明な液体である。

②　本品は、エタノール又はアセトニトリルに溶けやすく、水にやや溶けにくい。

５―ニトロソ―８―オキシキノリン～濃ヨウ化カリウム試液　（略）

（新設）

Ｌ―ノルロイシン～プロピオン酸ナトリウム、定量用　（略）

（新設）

ブロムクレゾールグリーン～マレイン酸　（略）

（新設）

無アルデヒドエタノール～レゾルシン　（略）

⑶　（略）

⑷　標準液

（略）

亜鉛標準液～水・メタノール標準液　（略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

リン酸塩pH標準液～リン標準液　（略）

⑸～⑼　（略）

８　各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準

⑴～⑹⑻　（略）

（新設）